

中山大学

二〇〇五年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 777

科目名称: 护理综合

考试时间: 1月23日上午

考生须知

全部答案一律写在答题纸上,
答在试题纸上的不得分! 请用
蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。
答题要写清题号, 不必抄题。

一、选择题(共60题, 每题1分)

答题说明: 下列每一道题中有A、B、C、D、E五个备选答案。在答题时, 只许从中选择一个最合适的答案, 写在答题纸上。

1. 支气管哮喘致呼吸衰竭的主要原因是:

- A. 气体弥散障碍
- B. 通气不足
- C. 呼吸中枢受抑制
- D. 肺容量减少
- E. 气体弥散面积减少

2. 抢救肺结核病人大咯血窒息最关键的措施是:

- A. 立即注射呼吸兴奋剂
- B. 立即吸氧
- C. 立即输血
- D. 立即让病人取头低脚高位, 并轻拍背部
- E. 立即进行人工呼吸

3. 张某, 女, 63岁, 有冠心病病史。休息时无明显不适, 从事较轻体力活动后, 出现心悸、气促, 需休息较长时间方能恢复。患者的心功能属于:

- A. 正常
- B. I级
- C. II级
- D. III级
- E. IV级

4. 慢性心功能不全的早期表现是:

- A. 心源性哮喘
- B. 下肢水肿
- C. 颈静脉充盈
- D. 心动过速
- E. 肝脏肿大

5. 急性心肌梗死病人发生左心衰竭的主要原因是:

- A. 阵发性室性心动过速
- B. 房室传导阻滞
- C. 心肌收缩力减弱或不协调
- D. 心脏负荷加重
- E. 室性期前收缩

6. 慢性肾衰竭患者心血管系统最常见的并发症为:

- A. 高血压
- B. 心力衰竭
- C. 心律失常
- D. 尿毒症性心肌炎
- E. 尿毒症性心包炎

7. 呼吸系统疾病最常见的症状是:

- A. 咳嗽
- B. 咳血
- C. 咳痰

- D. 呼吸困难
- E. 胸痛

8. 类风湿关节炎最常受累的关节是:

- A. 腕关节
- B. 肩关节
- C. 肘关节

- D. 踝关节
- E. 髋关节

9. 治疗十二指肠溃疡最重要的措施是:

- A. 饮食调节
- B. 使用胃粘膜保护剂
- C. 抑制胃酸分泌

- D. 解痉止痛
- E. 使用碱性药物

10. 急性胰腺炎病人血清淀粉酶升高的时间多在发病后:

- A. 1~3h
- B. 4~5h
- C. 6~12h

- D. 12~24h
- E. 48h

11. 下列哪项不是甲状腺功能亢进症的临床表现:

- A. 低热
- B. 记忆力减退
- C. 心律失常

- D. 表情淡漠
- E. 月经过多

12. 关于口服铁剂的护理, 下列哪项不正确:

- A. 饭前服用
- B. 避免与牛奶、咖啡同时服用
- C. 液体铁剂应用吸管服用

- D. 避免同时饮浓茶
- E. 避免同时服用抗酸药物

13. 男, 24岁, 3个月前患急性乙型病毒性肝炎, 近1周发热、全身皮肤粘膜出血。血红蛋白 70g/L, 红细胞 $2.5 \times 10^{12}/L$, 白细胞 $1.5 \times 10^9/L$, 骨髓检查: 红细胞、白细胞、巨核细胞均减少, 淋巴 0.74。最可能的诊断是:

- A. 粒细胞缺乏症
- B. 脾功能亢进症
- C. 急性白血病

- D. 再生障碍性贫血
- E. 营养性缺铁性贫血

14. 关于应用胰岛素的护理, 下列哪项措施不妥:

- A. 胰岛素应在室温 20℃以下储存
- B. 经常更换注射部位
- C. 长、短效胰岛素混合使用时, 先吸短效、再吸长效胰岛素

- D. 采用皮下注射
- E. 普通胰岛素饭前半小时注射

15. 急性左心功能不全时, 病人应采取的体位是:

- A. 平卧位
- B. 坐位
- C. 头低位

- D. 侧卧位
- E. 中凹位

16. 王先生, 56 岁, 有糖尿病史 8 年。今晨进食后突然出现心悸、胸闷、胸痛、面色苍白、烦躁、出冷汗伴恐惧感, 2 小时后仍未能缓解。体查: 心率 100 次/分, 血压下降。首先考虑的诊断是:
- A. 低血糖
B. 糖尿病性酸中毒
C. 变异型心绞痛
D. 不典型心绞痛
E. 急性心肌梗死
17. 系统性红斑狼疮皮肤损害最具特征性的表现是:
- A. 环型红斑
B. 玫瑰疹
C. 瘀点、瘀斑
D. 蝶形红斑
E. 紫癜
18. 缺铁性贫血的细胞学形态学分类属:
- A. 小细胞低色素性贫血
B. 小细胞正常色素性贫血
C. 巨幼红细胞性贫血
D. 正常细胞正常色素性贫血
E. 大细胞性贫血
19. 急性心肌梗死病人避免用力排便的主要目的是防止:
- A. 血压骤升致脑溢血
B. 诱发心律失常导致死亡
C. 血流加速导致脑栓塞
D. 过度用力导致虚脱
E. 腹压加剧导致呕吐
20. 男性, 25 岁, 2 天前体检偶然发现血压 150/90mmHg、尿蛋白 (++)、红细胞 0~1 个/HP, 眼底正常。应考虑为:
- A. 急性肾炎
B. 慢性肾炎
C. 原发性高血压
D. 高血压性肾损害
E. 慢性肾衰竭
21. 张女士, 47 岁。行左肺叶切除术后第 1 天, 诉胸闷、呼吸短促, 血气分析示 pH7.21, PaCO₂52mmHg, CO₂CP32mmol/L。护理上应特别注意:
- A. 及早吸氧
B. 补充血容量
C. 补碱性液
D. 按医嘱应用抗生素
E. 保持呼吸道通畅
22. 低钾血症最早的表现是:
- A. 腹胀
B. 恶心、呕吐
C. 心率加快
D. 肌肉无力
E. 心律失常
23. 破伤风最早发生紧张性收缩的肌群是:
- A. 面肌
B. 咀嚼肌
C. 颈背肌
D. 四肢肌群
E. 腹肌

24. 关于低血容量性休克病人的护理, 下列错误的是:

- A. 吸氧
- B. 平卧位
- C. 监测中心静脉压
- D. 用热水袋进行体表加温
- E. 输血前先将库存血复温后再输入

25. 任先生, 因塌方致张力性气胸、开放性左胫腓骨骨折、脾破裂。病人有休克、已昏迷。抢救时首先处理的是:

- A. 休克
- B. 昏迷
- C. 张力性气胸
- D. 骨折
- E. 脾破裂

26. 下肢静脉曲张病人行大隐静脉剥离术的主要前提条件是:

- A. 浅静脉回流通畅
- B. 深静脉通畅
- C. 交通支静脉瓣膜功能良好
- D. 大隐静脉瓣膜功能良好
- E. 深静脉瓣膜功能良好

27. 某女性, 甲状腺大部分切除术后出现手足抽搐, 应限制:

- A. 海味
- B. 肉类
- C. 豆制品
- D. 维生素 D
- E. 绿叶蔬菜

28. 某男性, 35 岁, 肛门疼痛 3 天, 局部有肿物突出, 无便血。体查: 体温 36.5°C , 肛门外有 0.7cm 直径的肿物、稍硬, 呈暗紫色, 触痛明显, 外表皮肤光滑、边界清楚。最可能的诊断是:

- A. 肛门周围皮下脓肿
- B. 肛裂
- C. 直肠息肉
- D. 内痔脱出
- E. 外痔血栓形成

29. 某男性, 24 岁, 胃穿孔行胃大部分切除术后第 6 天, 体温 39°C , 脉搏 108 次/分, 剑突下持续性钝痛, 伴呃逆, 查血常规示白细胞计数明显增加。首先考虑并发了:

- A. 膈下脓肿
- B. 肠间脓肿
- C. 盆腔脓肿
- D. 肺部感染
- E. 门静脉炎

30. 某男性, 18 岁, 不慎从树上掉下, 后枕部着地后, 有意识障碍约 15 分钟, 清醒后有逆行性遗忘, 并有头痛、恶心、呕吐。最可能的诊断是:

- A. 脑挫伤
- B. 脑震荡
- C. 硬脑膜下血肿
- D. 硬脑膜外血肿
- E. 脑内血肿

31. 诊断颅前窝骨折的主要依据是:

- A. 高处坠落史
- B. 头部血肿
- C. 脑脊液鼻漏
- D. 颅底骨折
- E. 意识障碍

32. 某男, 30 岁, 5 天前被汽车撞伤左上腹, 当时有腹部胀痛和局部压痛, 暂时留院观察。今日上厕所时突然昏倒, 面色苍白, 脉细速, 考虑为:

- A. 脾破裂
- B. 肝破裂
- C. 胰腺破裂
- D. 肠系膜血管破裂
- E. 肾破裂

33. 食管癌切除术后, 最严重的并发症是:

- A. 脓胸
- B. 乳糜胸
- C. 吻合口瘘
- D. 吻合口狭窄
- E. 反流性食管炎

34. 某男, 40 岁, 体重 65kg, 被热水烫伤 3 小时来院急诊。查体: 烫伤包括头面颈部、右上肢, 胸部有一手掌大小的烧伤面积。创面大水疱, 潮红, 水肿, 疼痛剧烈。该病人的烧伤面积和深度为:

- A. 18%, 浅 II 度
- B. 18%, 深 II 度
- C. 18%, III 度
- D. 19%, 浅 II 度
- E. 19%, 深 II 度

35. 某女, 45 岁, 出现明显黄疸、粪便白陶土色。B 超检查示胆总管及肝内胆管均扩张。进一步检查, 首选下列哪项?

- A. 腹部 X 线平片
- B. 口服胆囊造影
- C. 静脉胆道造影
- D. 经皮肝穿刺胆道造影
- E. 内镜逆行胰胆管造影

36. 肱骨中段骨折最易损伤的神经是:

- A. 腋神经
- B. 正中神经
- C. 尺神经
- D. 桡神经
- E. 肌皮神经

37. 先天性肥厚性幽门狭窄患儿呕吐的特点, 下列不正确的是:

- A. 多发生在生后 2~4 周
- B. 吐前无恶心症状
- C. 呕吐呈喷射状
- D. 呕吐量大
- E. 呕吐物为白色乳汁, 含胆汁

38. 前列腺增生急性尿潴留的诱发因素中, 下列哪项因素无关?

- A. 抽烟
- B. 喝酒
- C. 受凉
- D. 劳累
- E. 憋尿

39. 毛先生, 56 岁, 无明显原因反复出现无痛性肉眼血尿 2 月余。给抗感染治疗, 未见明显好转。应考虑为:

- A. 前列腺增生
- B. 泌尿系肿瘤
- C. 泌尿系感染
- D. 泌尿系结石
- E. 泌尿系损伤

49. 早期确诊子宫内膜癌的方法是:
- A. 宫颈刮片
 - B. 宫颈活检
 - C. B 超
 - D. 分段诊断性刮宫
 - E. 双合诊
50. 侵蚀性葡萄胎较常见的转移部位是:
- A. 阴道
 - B. 肺
 - C. 脑
 - D. 肝脏
 - E. 肾脏
51. 原发性肾病综合征发生浮肿的主要原因是:
- A. 大量蛋白尿
 - B. 肾小球滤过率明显下降
 - C. 分泌醛固酮增多
 - D. 分泌抗利尿激素增多
 - E. 肾小管重吸收水、钠增多
52. 有关急性肾炎临床特点的描述, 以下不正确的是:
- A. 多见于 5~10 岁儿童
 - B. 病初可有低热、乏力
 - C. 有浮肿、少尿、血尿
 - D. 绝大多数转为肾炎性肾病
 - E. 重者可出现急性肾衰竭
53. 某患儿, 听诊胸骨左缘第二肋间有连续性、机械样杂音, 考虑为:
- A. 肺动脉瓣狭窄
 - B. 室间隔缺损
 - C. 法洛氏三联征
 - D. 动脉导管未闭
 - E. 房间隔缺损
54. 关于新生儿寒冷损伤综合征临床特点的描述, 以下不正确的是:
- A. 患儿反应差
 - B. 有水肿
 - C. 常于身体受压部位发生硬肿
 - D. 病变肤色暗红
 - E. 体温低
55. 关于轻型婴儿腹泻临床特点的描述, 以下不正确的是:
- A. 大便呈蛋花汤样
 - B. 每天大便可达 10 次
 - C. 大便腥臭、可有粘液
 - D. 有电解质紊乱及全身中毒症状
 - E. 大便镜检有大量脂肪滴
56. 以下不符合儿童风湿热临床特点的是:
- A. 皮下结节
 - B. 类风湿因子阴性
 - C. 血沉增快
 - D. 有心肌炎表现
 - E. X 线见长骨关节面破坏
57. 营养不良患儿最早的临床表现是:
- A. 体重不增或减轻
 - B. 身长低于正常
 - C. 皮下脂肪减少或消失
 - D. 皮肤干燥、苍白、失去弹性
 - E. 肌张力低下

58. 小儿肺结核的主要类型是:

- A. 原发性肺结核
- B. 粟粒性肺结核
- C. 结核性胸膜炎
- D. 结核性脑膜炎
- E. 干酪性肺炎

59. 男性, 1岁半, 低热、咳嗽3天, 气喘1天, 查体: $T38.5^{\circ}\text{C}$, 呼吸促, 鼻翼扇动, 三凹征阳性, 口唇发绀, 双肺布满中、细湿性啰音。考虑为:

- A. 支气管肺炎
- B. 气管异物
- C. 支气管哮喘
- D. 支气管炎
- E. 上呼吸道感染

60. 下列哪种先天性心脏病属左向右分流型?

- A. 法洛氏三联征
- B. 右位心
- C. 房间隔缺损
- D. 主动脉狭窄
- E. 肺动脉狭窄

二、问答题 (90分, 每题15分, 共6题)

1. 谢女士, 32岁, 规律性上腹隐痛伴反酸3年, 未行规则治疗。近日症状加重, 自觉上腹饱胀不适, 餐后疼痛加重, 曾呕吐2次, 呕吐物为酸腐味宿食, 呕吐后疼痛暂时缓解。问:

- (1) 最可能的医疗诊断?
- (2) 能明确诊断的辅助检查有哪些?
- (3) 护理要点?

2. 关先生, 63岁。夜间睡眠突然感到呼吸受“憋”而醒, 被迫端坐呼吸、喘息, 面色灰白, 口唇青紫, 咳粉红色泡沫痰。体查: 呼吸促, 双肺闻哮鸣音, 双肺底闻及少许湿啰音, 心界叩诊呈靴形增大, 心尖区及主动脉瓣区闻及II~III级收缩期吹风样杂音, 肺动脉瓣第二心音亢进。既往曾有3次类似发作, 但较轻, 未予重视。问:

- (1) 病人可能发生了哪种急重症?
- (2) 急诊处理原则?
- (3) 针对目前情况, 如何护理?

3. 病人, 男, 52岁, 因阵发性腹痛伴呕吐5小时急诊入院。入院时软弱乏力、恶心。体查: 皮肤干燥、唇干, 眼窝凹陷, $T36.4^{\circ}\text{C}$, $P105$ 次/分, $Bp108/80\text{mmHg}$, 腹稍胀, 未见肠型及蠕动波, 腹式呼吸减弱, 下腹部轻度压痛, 叩诊鼓音, 移动性浊音阴性, 听诊肠鸣音亢进。

实验室检查: 白细胞数为 $12 \times 10^9/\text{L}$, 血清钠为 142mmol/L 。腹部X线平片可见肠襻胀气及多个液气平面。问:

- (1) 根据临床资料, 该病人最可能的医疗诊断是什么?
- (2) 如采取非手术治疗, 请述如何护理。
- (3) 病情观察过程中, 出现了哪些情况提示病情严重, 应马上手术处理?

4. 病人, 男, 43 岁, 不慎被车撞伤左髌部, 疼痛、不能站立 2 小时入院。查体: T36.5℃, P 105 次/分, R 26 次/分, Bp 80/60mmHg。病人表情淡漠, 肤色苍白, 四肢冰凉。左髌部外侧肿胀, 左下肢内收、短缩、外旋畸形, 髌部有压痛及叩击痛, 左腿比右腿短缩约 2cm, X 光摄片示左股骨粗隆下方骨折。问:

- (1) 该病人的医疗诊断? 伴有哪种情况?
- (2) 急救处理时, 病人选择什么体位最合适?
- (3) 病情稳定后, 病人适宜哪种牵引方法? 如何保持有效的牵引?

5. 某女, 30 岁, 已婚, 停经 45 天, 阴道少许出血 3 天。今晨突发右下腹剧痛伴肛门坠胀感, 恶心, 血压 60/40mmHg, 下腹有明显压痛及反跳痛, 并有移动性浊音, 宫颈举痛阳性, 后穹隆穿刺抽出 5ml 暗红色不凝血液。问:

- (1) 病人最可能的医疗诊断?
- (2) 目前主要护理措施?
- (3) 病人日后的出院指导?

6. 患儿, 男, 3 岁, 面色苍白、反复发热四个月。体查: T36.8℃, R28 次/分, P106 次/分。神倦, 乏力, 面色苍白。全身营养状况稍差, 体重 12Kg, 身高 90cm。有多处皮肤淤斑。心肺听诊正常, 肝肋下 3cm, 脾肋下 1 cm。实验室检查: Hb: 85g/L, WBC: $6 \times 10^9/L$, 粒细胞 25%, 血小板 $120 \times 10^9/L$ 。问:

- (1) 该患儿的医疗诊断?
- (2) 主要的治疗方法?
- (3) 主要的护理诊断 (4 个) 及护理措施。