

# 中山大学

## 二〇一〇年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 308

科目名称: 护理综合

考试时间: 1 月 10 日 上 午

### 考生须知

全部答案一律写在答题纸上,  
答在试题纸上的不得分! 请用蓝、  
黑色墨水笔或圆珠笔作答。答题要  
写清题号, 不必抄原题。

一. 单项选择题(下列的每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最合适的答案, 写在答题纸上。共 120 题, 每题 1.5 分, 共 180 分)

单项选择题答题导引: 请严格按照以下格式(10 小题一行), 把选项列在相应的题号后写在答题纸上。并注意字迹清晰。

1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ;  
11. ; 12. ; 13. ; 14. ; 15. ; 16. ; 17. ; 18. ; 19. ; 20. ;  
.....

1. 在护理学基本概念中, 人的整体性不包括:

- A. physiological                      B. psychological                      C. sociocultural  
D. spiritual                              E. role performance

2. Nursing as "the diagnosis and treatment of human responses to actual or potential health problems". 这一护理概念的出处是:

- A. Nightingale, 1959                      B. Henderson, 1966                      C. George, 1975  
D. WHO, 1980                              E. American Nursing Association, 1980

3. 在收集资料的过程中, 交谈进行阶段的主要目的是:

- A. 与病人建立友善关系                      B. 告诉病人谈话的目的                      C. 收集资料  
D. 锻炼沟通技巧                              E. 引导谈话的方向

4. 机体分泌大量的激素, 组织愈合加快, 发生在睡眠的:

- A. 慢波睡眠第 I 期                      B. 慢波睡眠第 II 期                      C. 慢波睡眠第 III 期  
D. 慢波睡眠第 IV 期                      E. 快波睡眠期

5. 对肌肉等长练习的描述不正确的是:

- A. 肌肉收缩时不改变肌肉长度                      B. 也叫静力练习  
C. 有利于改善肌肉的神经控制                      D. 其优点是不引起明显的关节运动  
E. 肢体被固定时早期应用可预防肌肉萎缩

6. 新生儿及老年病人的病室的适宜温度为:

- A. 16℃~18℃                              B. 18℃~20℃                              C. 20℃~22℃  
D. 22℃~24℃                              E. 24℃~26℃

7. 引起青霉素过敏反应的抗体是:

- A. IgA                                      B. IgD                                      C. IgM  
D. IgG                                      E. IgE

考试完毕, 试题和草稿纸随答题纸一起交回。

第 1 页 共 16 页

8. 沟通的最高层次是:
- A. 一般性沟通                      B. 分享感觉                      C. 分享个人的想法
- D. 一致性沟通                      E. 陈述事实的沟通
9. 青霉素皮内注射的剂量是:
- A. 10U                                  B. 50U                                  C. 80U
- D. 100U                                  E. 150U
10. 按照艾瑞克森的心理社会发展学说, 解决主动对内疚的矛盾冲突是下列哪一时期的发展任务:
- A. 18个月~3岁以内                      B. 3~6岁以内                      C. 6~12岁以内
- D. 12~18岁以内                      E. 18~40岁以内
11. 给一1岁零8个月的患儿肌内注射青霉素, 其注射部位最好选用:
- A. 臀大肌                                  B. 臀中、小肌                      C. 上臂三角肌
- D. 前臂外侧肌                      E. 股外侧肌
12. Orem 认为护理是:
- A. 帮助个体获得最高水平的健康                      B. 有目的的减少应激源对服务对象的影响
- C. 控制应激源使个体达到适应                      D. 促使适应反应使个体平衡
- E. 克服或预防自理缺陷的发展
13. Roy 适应模式主要阐述:
- A. 人是一个具有生物和社会属性的适应系统
- B. 通过三个层次的预防来达到对环境的适应
- C. 人对环境的刺激源进行适应的过程
- D. 环境中对人产生影响的刺激可分为三种
- E. 可通过三种护理系统来帮助个体
14. Roy 适应模式的护理程序中, 二级评估是:
- A. 对生理功能方面的评估                      B. 对自我概念方面的评估
- C. 明确角色功能的情况                      D. 对相互依赖方面的评估
- E. 明确问题的原因
15. 针对一有心包大量积液的病人应采用:
- A. 侧卧位                                  B. 半坐卧位                      C. 端坐位
- D. 平卧位                                  E. 屈膝仰卧位
16. 促进病人舒适护理中, 最重要的一项是:
- A. 采取适应病情的舒适卧位                      B. 保持身体良好的清洁卫生
- C. 促进病人角色适应                      D. 找出导致病人不舒适的原因, 给予针对性的护理
- E. 加强心理护理
17. 一胃癌住院病人告诉护士: 其腹部很痛, 难以忍受, 睡眠受干扰, 要求护士给他用镇痛药。根据 WHO 对疼痛程度的分级, 该病人此时的疼痛是:
- A. 0级                                  B. 1级                                  C. 2级
- D. 3级                                  E. 4级
18. 以下关于影响睡眠因素的描述, 正确的是:

- A. 睡眠时间与年龄成正比  
B. 发热病人会使睡眠减少  
C. 体育锻炼能促进睡眠  
D. 睡眠不好的人避免在睡前 8~10 小时喝浓茶  
E. 乳制品中因含有 L-色氨酸而能促进睡眠

19. 以下关于护理程序的说法, 正确的是:

- A. 护理程序的步骤可根据具体情况而定  
B. 系统论是护理程序的基本理论基础  
C. 实施计划应在书面护理计划完成后进行  
D. 每次只执行一个护理诊断相对应的护理措施  
E. 完成护理评价意味着护理程序的结束

20. 静脉输液时若不慎发生空气栓塞, 致死的原因是:

- A. 空气栓塞在主动脉入口  
B. 空气栓塞在肺动脉入口  
C. 空气栓塞在上腔动脉入口  
D. 空气栓塞下腔动脉入口  
E. 空气栓塞肺静脉入口

21. 一癌症晚期病人, 入院时臀部有一 2CM × 2CM 大小的疮面, 真皮层有黄色渗出液, 该病人压疮为:

- A. 瘀血红润期  
B. 炎性浸润期  
C. 浅度溃疡期  
D. 深度溃疡期  
E. 坏死溃疡期

22. 测血压时袖带缠绕过紧对测量结果的影响为:

- A. 无影响  
B. 仅收缩压升高  
C. 血压值偏低  
D. 仅舒张压降低  
E. 血压值偏高

23. 病人李大伯, II 型呼吸衰竭, 如果给予高浓度吸氧有可能引起:

- A. 恶心、呕吐  
B. 烦躁不安  
C. 进行性呼吸困难  
D. 二氧化碳麻痹  
E. 面色苍白

24. 炎症早期用热的目的是:

- A. 降低神经兴奋性  
B. 促进渗出物吸收  
C. 解除肌肉痉挛  
D. 使血管扩张充血  
E. 溶解坏死组织

25. 要素饮食经造瘘管滴入时溶液的温度为:

- A. 37℃  
B. 38~39℃  
C. 39~40℃  
D. 40~41℃  
E. 41~42℃

26. 吸痰时, 每次导管插入吸痰的时间不应超过:

- A. 5s  
B. 10s  
C. 15s  
D. 20s  
E. 25s

27. 临床应用最广泛的资料整理分类方法是:

- A. 按功能性健康型态分类  
B. 按人类反应型态分类  
C. 按人类基本需要层次论分类  
D. 按护理对象的意愿分类  
E. 按对生命活动的影响程度分类

28. 一危重症病人留置导尿管 24h 尿量大约 70ml, 判断其排尿状况为:

- A. 正常  
B. 尿量偏少  
C. 少尿  
D. 无尿  
E. 尿潴留

29. 病人, 女, 76 岁, 自诉臀部疼痛。护士检查发现其骶尾部皮肤呈红色, 转换体位后皮肤红色不退。该情况属于压疮的:

- A. 反应性充血期
- B. 淤血红润期
- C. 炎性浸润期
- D. 浅度溃疡期
- E. 坏死溃疡期

30. 某病人出现高热, 以下哪项治疗应暂缓实施:

- A. 输液
- B. 输血
- C. 吸氧
- D. 吸痰
- E. 静脉采血

31. 高浓度、高流量给氧适用于:

- A. 肺性脑病
- B. 急性肺水肿
- C. 肺癌
- D. 肺气肿
- E. 昏迷

32. 以下指导病人服药的方法中不正确的是:

- A. 对胃粘膜有刺激性的药应饭后服
- B. 健胃药物应在饭前服
- C. 退热药服后应多喝水
- D. 磺胺类药服后应多喝水
- E. 止咳糖浆服后应多喝水

33. Kcl 通过静脉输液的形式输入体内时其输入浓度应为:

- A. 10%
- B. 5%
- C. 1%
- D. 0.9%
- E. 0.3%

34. 病人因脑水肿需静脉滴注 20%甘露醇 500ml, 要求在 50 分钟内滴完, 输液速度应为

- A. 100 滴/分
- B. 120 滴/分
- C. 150 滴/分
- D. 170 滴/分
- E. 180 滴/分

35. 发生溶血反应时, 护士首先应:

- A. 测量血压、脉搏、呼吸
- B. 通知医生
- C. 安慰病人和家属
- D. 停止输血, 给病人吸氧并保留余血
- E. 建立另一静脉输液通道

36. 病人王某, 因癫痫病突然跌倒, 此时急救的首要步骤是:

- A. 口对口人工呼吸
- B. 胸外心脏按压
- C. 氧气吸入
- D. 应用简易呼吸机
- E. 清除呼吸道分泌物

37. 病人在实施机械通气后 3 天出现肺部感染, 最可能的致病菌是:

- A. 肺炎球菌
- B. 肺炎杆菌
- C. 大肠杆菌
- D. 铜绿假单胞菌
- E. 溶血性链球菌

38. 在护理进行水封瓶引流的气胸病人时, 发现水封瓶引流管内的水柱停止波动, 你应首先采取的措施是:

- A. 让病人轻咳几下
- B. 挤压引流管
- C. 立即通知医生
- D. 更换新的水封瓶
- E. 检查外置引流管是否受压

39. 急性心肌梗死病人发生休克最主要的原因或机制为:

- A. 心律失常
- B. 左室排血量减少
- C. 心脏前负荷增加
- D. 心脏后负荷增加
- E. 疼痛

40. 慢性心力衰竭的最重要的基础治疗是:

- A. 抗心室重塑
- B. 强心
- C. 利尿
- D. 减慢心率
- E. 心肌营养

41. 下列哪项不是呼吸衰竭合并二氧化碳潴留的表现:

- A. 紫绀
- B. 睡眠倒置
- C. 球结膜水肿
- D. 皮肤温暖、多汗
- E. 嗜睡

42. 中心型肺癌病人最常见的早期症状是:

- A. 刺激性呛咳
- B. 局部胸痛
- C. 持续咳血丝痰
- D. 气促
- E. 不明原因关节痛

43. 成年人肺结核最常见的临床类型是:

- A. 原发型肺结核
- B. 血行播散型肺结核
- C. 继发性肺结核
- D. 肺外结核
- E. 结核性胸膜炎

44. 病人男, 68 岁, 临床诊断为“COPD 并发肺源性心脏病”而收住入院。血气分析结果为:  $\text{PaO}_2$  54mmHg,  $\text{PaCO}_2$  62mmHg, 其氧疗的方法宜选择:

- A. 持续低流量给氧
- B. 持续高流量给氧
- C. 持续高流量、高浓度给氧
- D. 持续低流量、低浓度给氧
- E. 间断低流量给氧

45. 慢性心衰最常见的原因是:

- A. 心肌缺血
- B. 心瓣膜病
- C. 高血压
- D. 心肌炎
- E. 心肌病

46. 当你为一位慢性心功能不全的病人发放洋地黄时, 常规检查中发现病人的脉搏为 60 次/分, 不整, 此时你应:

- A. 立即停止发药并报告医生
- B. 询问有无其他不适后再发药
- C. 照常发药但注意观察
- D. 发药后即报告医生
- E. 照常发药

47. 以下哪项最有助于确定病人的呼吸困难是由左心衰引起的:

- A. 伴明显咳嗽
- B. 突出现
- C. 夜间出现
- D. 平卧时明显加重
- E. 活动后出现

48. 以下哪项内容的观察与水肿消长情况的判断无关:

- A. 定期测量体重
- B. 记 24 小时尿量
- C. 记 24 小时入量
- D. 水肿的部位与范围
- E. 皮肤完整性

49. 慢性心衰病人早期常规应用 ACEI 制剂的主要目的是:

- A. 减轻心脏后负荷
- B. 减轻心脏前负荷
- C. 减缓心室重构
- D. 增加心肌收缩力
- E. 减慢心率

50. 护理诊断: 气体交换受损 与慢性心衰引起的肺瘀血有关, 其主要的护理措施下列哪些是错误的:

- A. 协助采取舒适的体位, 如半坐卧位; 氧气吸入
- B. 饮食上要尽量吃饱、吃好
- C. 保持二便通畅
- D. 补液速度应控制在  $<30$  滴/分

E. 严密观察病情变化

51. 最危险的心律失常是:

- A. 室早 R on T
- B. 阵发性室速
- C. 心室纤颤
- D. 心房纤颤
- E. III度房室传导阻滞 (AVB)

52. 病毒性心肌炎最重要的基础治疗和 (或) 护理措施是:

- A. 充分休息
- B. 加强营养
- C. 吸氧
- D. 激素的应用
- E. 抗病毒药物的应用

53. 关于感染性心内膜炎的叙述, 下列哪项是错误的:

- A. 多见于心瓣膜关闭不全的病人
- B. 感染细菌多为毒力较弱的一些条件致病菌
- C. 心瓣膜病变病人持续发热 1 周以上, 应注意该病的可能性
- D. 反复多次的血培养是确诊的唯一依据
- E. 早期、足量、静脉应用抗生素是其主要的治疗措施

54. 某心脏病病人, 床上排便后突出现极度呼吸困难, R36 次/分, 烦躁不安, 频咳, 并咳出粉红色泡沫痰, 双肺可闻弥漫性干湿性罗音, 作为现场护士首选的措施是:

- A. 立即报告值班或主管医生
- B. 立即协助病人采取半坐卧位或端坐位
- C. 立即给予高压、高流量、酒精湿化吸氧
- D. 立即建立静脉通道
- E. 立即向家人口头报告病情危重

55. 男性病人, 63 岁, 突发胸骨后压榨样疼痛 2 小时, 可向左肩背部放射, 伴呕吐、冷汗。即查 T 37℃, P 110 次/分, R 24 次/分, BP110/60mmHg。痛苦面容。ECG 示多个胸导联出现 S-T 段呈弓背向上抬高, 频发室早。对该病人首要提出的护理问题或医护合作性问题应该是:

- A. 疼痛
- B. 恐惧
- C. 潜在并发症: 心脏骤停
- D. 潜在并发症: 休克
- E. 潜在并发症: 急性左心衰

56. 某高血压病病人, 突发剧烈头痛、心悸、胸闷不适、脸色潮红, 有恶心无呕吐。即查血压为: 270/125 mmHg, 神清, 此时病人最大的可能是并发:

- A. 恶性高血压
- B. 脑出血
- C. 高血压危象
- D. 高血压脑病
- E. 严重心律失常

57. 提示右心衰体循环瘀血最重要的体征是:

- A. 肝脏肿大
- B. 腹水
- C. 颈静脉充盈
- D. 下肢水肿
- E. 肝颈静脉回流征阳性

58. 有助于慢性胃炎临床诊断最重要的依据是:

- A. 详细询问病史
- B. 全面体格检查
- C. 胃液分析
- D. X 线钡餐检查
- E. 胃镜活组织检查

59. 肾小管功能受损早期常以哪一症状为主:

- A. 日尿量增多
- B. 夜尿量增多
- C. 全日尿量增多
- D. 全日尿量减少
- E. 大量蛋白尿

60. 腹泻伴里急后重的病人, 常提示病变的部位为:

- A. 回肠
- B. 空肠
- C. 升结肠
- D. 横结肠
- E. 乙状结肠以下的消化道

61. 糖尿病的诊断标准是:症状+静脉血浆葡萄糖值:

- A. 随机或餐后 2h $\geq$ 11.1 mmol/L 或空腹 $\geq$ 7.0 mmol/L
- B. 随机或餐后 2h $\geq$ 7.8 mmol/L 或空腹 $\geq$ 7.0 mmol/L
- C. 随机或餐后 2h $\geq$ 11.1 mmol/L 或空腹 $\geq$ 7.8 mmol/L
- D. 随机或餐后 2h $\geq$ 6.1 mmol/L 或空腹 $\geq$ 7.0 mmol/L
- E. 随机或餐后 2h $\geq$ 7.0 mmol/L 或空腹 $\geq$ 6.1 mmol/L

62. 典型溃疡性结肠炎腹痛的特征是:

- A. 进食—腹痛—便意—便后加剧
- B. 腹痛—便意—便后缓解
- C. 进食—腹痛加剧
- D. 腹痛—便意—便后加剧
- E. 进食—腹痛减轻

63. 关于肝硬化大量腹水病人的护理, 下列哪项是错误的:

- A. 协助取平卧位
- B. 低盐饮食
- C. 水分摄取控制在 1000ml/d
- D. 定期测量体重与腹围
- E. 遵医嘱合理使用利尿剂

64. 原发性肝癌早期最主要的临床表现是:

- A. 进行性消瘦
- B. 进行性肝大
- C. 持续性肝区胀痛
- D. 进行性加重的黄疸
- E. 血性腹水

65. 肝性脑病最常见的早期表现是:

- A. 昏睡
- B. 嗜睡
- C. 定向力障碍
- D. 扑翼样震颤
- E. 轻度性格与行为的异常

66. 关于急性胰腺炎腹痛的临床特征, 下列哪项除外:

- A. 饱餐或酗酒后发作
- B. 疼痛常位于上腹部
- C. 间歇发作性痛为主
- D. 常伴剧烈呕吐, 但吐后腹痛无缓解
- E. 可向左腰背部呈束带状放射

67. 高血压伴低血钾是下列哪种疾病的临床特征之一:

- A. 嗜铬细胞瘤
- B. 柯兴氏综合征
- C. 慢性肾病
- D. 糖尿病肾病
- E. 原发性醛固酮增多症

68. 尿毒症病人出现少尿又需要输血时, 应尽可能避免输用库存血的原因是:

- A. 抗体明显减少
- B. RBC 寿命缩短
- C. 易引起溶血
- D. 易引起尿素氮的升高
- E. 易引起血钾升高

69. 慢性肾炎治疗的主要目的是:

- A. 消除血尿
- B. 消除蛋白尿
- C. 治疗水肿
- D. 促进血浆蛋白水平升高
- E. 防止或延缓肾功能进行性恶化

70. 病人男, 22 岁。因“反复颜面浮肿伴泡沫样尿一年”拟诊为“肾病综合征”而收住入院予“激素强化治疗”。作为主管护士, 你首要关注的护理问题或医护合作性问题是:

- A. 有感染的危险
- B. 潜在并发症: 消化道出血
- C. 有皮肤完整性受损的危险
- D. 潜在并发症: 心力衰竭
- E. 潜在并发症: 骨质疏松症

71. 尿毒症病人最早出现的临床表现是:

- A. 贫血  
D. 皮肤瘙痒
- B. 出血  
E. 恶心、呕吐、食欲下降
- C. 心力衰竭

72. 针对一名患有急性肾盂肾炎的女青年所给予的保健指导, 下列哪项是错误的:

- A. 避免劳累  
D. 禁止盆浴
- B. 低盐饮食  
E. 勤排尿
- C. 多饮水

73. 某 ITP 病人住院期间突发出现剧烈头痛、呕吐、视力模糊等症状, 提示:

- A. 败血症  
D. 颅内出血
- B. 急性脑膜炎  
E. 高血压脑病
- C. 急性脑炎

74. 典型再障的临床表现不应包括:

- A. 进行性贫血  
D. 持续高热
- B. 皮下及牙龈出血  
E. 内脏出血
- C. 肝脾肿大

75. 重症哮喘时, 血气分析常显示:

- A. 呼吸性酸中毒  
C. 代谢性酸中毒  
E. 正常
- B. 呼吸性碱中毒  
D. 代谢性碱中毒

76. 成年人缺铁性贫血最常见的原因是:

- A. 饮食中缺铁  
D. 慢性失血
- B. 需铁量增加  
E. 慢性溶血
- C. 铁吸收不良

77. 癫痫持续状态的药物治疗首选:

- A. 地西泮  
D. 异戊巴比妥钠
- B. 水合氯醛  
E. 甘露醇
- C. 苯妥英钠

78. 甲亢病人的饮食指导中, 应告诫病人应尽可能避免食(饮)用:

- A. 碳水化合物和糖  
D. 淡水鱼
- B. 家禽类动物  
E. 浓茶或咖啡
- C. 蔬菜、水果

79. SLE 病人最具特征性的临床表现是:

- A. 多个大关节疼痛  
D. 持续蛋白尿
- B. 持续不规则发热  
E. 皮下出血或月经量增多
- C. 面部出现蝶形红斑

80. 对称性小关节肿痛伴晨僵, 是哪种疾病的主要表现:

- A. 痛风  
D. 系统性红斑狼疮
- B. 风湿热  
E. 强直性脊柱炎
- C. 类风湿性关节炎

81. 病人男, 65 岁, 有高血压病史多年, 3 小时前在情绪激动中突然剧烈头痛, 伴喷射状呕吐, 随后意识丧失而急诊留观, 以下处理哪项是不正确的:

- A. 平卧头偏一侧体位  
C. 及早定时多给病人翻身  
E. 密切注意呼吸节律的改变
- B. 密切观察瞳孔变化  
D. 及时清除呕吐物

82—84 题共用资料:

病人男, 45 岁, 患溃疡病史 10 年, 昨天起上腹痛加剧, 并先后 5 次排出柏油样糊状便, 每次约 100-200ml, 今晨又 2 次排出柏油样糊状便约 500ml, 随后出现面色苍白、皮肤湿冷, 呼之不应而急诊入院。体查: 病人意识模糊, 口唇紫绀, P125 次/分, R25 次/分, Bp80/55mmHg。



82. 根据病人的临床表现, 估计其出血量为:

- A. 250-300ml      B. 300-500 ml      C. 500-800 ml  
D. 800-1000 ml      E. >1000 ml

83. 在护理该病人时哪项护理诊断应首先考虑:

- A. 心输出量减少      B. 潜在并发症: 血容量不足  
C. 组织灌注量不足      D. 意识障碍  
E. 潜在并发症: 上消化道出血

84. 对该病人首先应采取的护理措施是:

- A. 吸氧      B. 心理安慰      C. 建立静脉通道  
D. 注意保暖      E. 肛周皮肤护理

85. 姚女士, 48 岁, 肝癌根治术后合并肺部感染。血气分析: pH7.25,  $\text{HCO}_3^-$  29mmol/L,  $\text{PaCO}_2$  52mmHg。考虑为

- A. 呼吸性酸中毒      B. 呼吸性碱中毒      C. 代谢性酸中毒  
D. 代谢性碱中毒      E. 混合性碱中毒

86. 高血钾病人禁用

- A. 等渗盐水      B. 10%葡萄糖溶液      C. 平衡盐溶液  
D. 5%碳酸氢钠      E. 5%葡萄糖

87. 某男, 慢性肠痿 1 个多月, 感觉疲乏、头晕、软弱无力, 测其血清钠为 130mmol/L。补充病人所丢失的液体, 首选下列哪种液体?

- A. 5%葡萄糖      B. 10%葡萄糖      C. 0.9%氯化钠  
D. 5%氯化钠      E. 5%碳酸氢钠

88. 消除破伤风毒素来源最有效的方法是

- A. 注射抗菌素      B. 注射抗毒素  
C. 注射人体免疫球蛋白      D. 注射破伤风抗毒素 (TAT)  
E. 彻底清创

89. 给破伤风病人静脉注射硫喷妥钠时, 应警惕

- A. 体位性低血压      B. 喉头痉挛和呼吸抑制      C. 意识障碍  
D. 低血容量性休克      E. 心跳骤停

90. 某成年男性, 头面部、左上肢被火烧伤, 胸前还有两巴掌大小的烧伤。其烧伤面积为

- A. 15%      B. 16%      C. 17%  
D. 18%      E. 19%

91. 血栓闭塞性脉管炎的病变主要累及

- A. 下肢大隐静脉      B. 下肢末梢神经  
C. 四肢交感神经      D. 四肢中小动脉, 伴行静脉亦常受累  
E. 四肢中小静脉, 伴行动脉亦常受累

92. 某男, 52 岁, 腹股沟斜疝发生嵌顿, 行手法复位, 目前应重点观察

- A. 体温、脉搏      B. 血压      C. 神志  
D. 尿量      E. 腹膜炎表现

93. 某男, 66 岁, 右侧腹股沟疝。10h 前, 用力排便时突感肿块明显增大, 腹痛难忍, 呕吐数次, 伴发热、全身不适。查体: 右腹股沟及阴囊可扪及肿块, 张力高, 触痛明显, 全腹有压痛、腹肌紧张。白细胞计数明显增高。拟行急诊手术。此类疝属

- A. 腹股沟斜疝, 嵌顿性疝
- B. 腹股沟直疝, 嵌顿性疝
- C. 腹股沟斜疝, 绞窄性疝
- D. 腹股沟直疝, 绞窄性疝
- E. 股疝, 绞窄性疝

94. 某男, 65 岁, 患胃溃疡 9 年。近 1 个月来, 上腹部胀满不适, 并反复呕吐带酸臭味的宿食, 呕吐后病人自觉胃部舒适。体查: 皮肤干燥、弹性差, 唇干; 上腹部膨隆, 可见胃型和蠕动波, 手拍上腹部可闻及振水声。拟行手术治疗而收治入院。该病人行手术治疗的主要原因

- A. 长期患胃溃疡
- B. 合并胃溃疡穿孔
- C. 合并溃疡大出血
- D. 合并瘢痕性幽门梗阻
- E. 胃溃疡疑有恶变

95. 某直肠癌病人行 Miles 术后第 8 天, 已进食, 病人仍无大便、诉腹胀, 下列护理措施中不正确的是

- A. 顺时针轻轻按摩腹部
- B. 低压灌肠
- C. 口服缓泻剂
- D. 鼓励病人多饮水
- E. 增加饮食中的膳食纤维含量

96. Trendelenburg 试验的目的是检查

- A. 下肢浅静脉回流是否通畅
- B. 大隐静脉和交通静脉瓣膜功能是否良好
- C. 交通支静脉有无阻塞
- D. 下肢深静脉有无阻塞
- E. 深静脉瓣膜功能是否良好

97. 直肠肛管手术后发生大便失禁主要是由于手术切断了

- A. 肛管直肠环
- B. 肛门内括约肌
- C. 肛门外括约肌
- D. 齿状线
- E. 阴部神经

98. 病人行毕 II 式胃大部分切除术, 术后第 1 天, 护士查房时见胃管内吸出咖啡色胃液约 250ml。正确的处理是

- A. 继续观察, 不需特殊处理
- B. 停止胃肠减压
- C. 应用止血药
- D. 加快输液速度
- E. 马上送手术室止血

99. 病人李某, 男性, 27 岁, 半年前因肛周皮下脓肿行切开引流术, 之后局部皮肤反复破溃、溢脓 2 年余。局部检查: 肛周右侧距肛门约 4cm 处有一乳头状隆起, 挤压后有少许脓液排出。首先考虑的疾病是

- A. 血栓性外痔
- B. 肛裂
- C. 肛瘘
- D. 内痔脱出
- E. 肛门周围脓肿

100. 某男, 58 岁, 被汽车撞击下腹部后, 觉下腹部剧痛, 不能活动, 当即被送往医院救治。体查: 面色苍白, 呼吸急促, P 120 次/分, Bp70/50mmHg; 下腹膨隆, 并有压痛、反跳痛、腹肌紧张, 会阴部有青紫, 导尿管插入引出 300ml 血性液后再无尿液引出, X 线摄片示骨盆骨折, B 超示盆腔有较多量积液。该病人尿道损伤的部位是

- A. 阴茎部
- B. 球部
- C. 膜部
- D. 前列腺部
- E. 悬垂部

101. 某男, 65 岁, 患良性前列腺增生症。夜尿增多, 2-3 次/晚, 近 1 年来有排尿迟缓、尿线变细现象。残余尿量 5ml, 最大尿流率 12ml/s。首选的治疗方式是
- A. 等待观察、定期随访                      B. 药物治疗  
C. 尿道放置支架                              D. 耻骨上经膀胱前列腺摘除术  
E. 经尿前列腺电切除术
102. 下列哪种膀胱癌根治术后需指导病人作排尿训练?
- A. 可控膀胱术                                  B. 回肠代膀胱术  
C. 原位新膀胱术                              D. 经尿道膀胱癌电切除术  
E. 膀胱部分切除术
103. 全身麻醉前给予抗胆碱药的作用是
- A. 镇静    B. 镇痛    C. 减少呼吸道分泌物  
D. 对抗局麻药毒性                          E. 抑制交感神经兴奋
104. 甲状腺大部分切除术后病人, 进流质食物时出现呛咳, 发音正常, 可能是
- A. 喉头水肿                                      B. 喉上神经内支损伤  
C. 喉上神经外支损伤                          D. 喉上神经内外支损伤  
E. 喉返神经损伤
105. 肝叶切除术后病人, 出现嗜睡、烦躁不安、黄疸, 应考虑
- A. 膈下脓肿                                      B. 内出血                                      C. 肝性脑病  
D. 胆汁性腹膜炎                              E. 胆道感染
106. ERCP 检查是指
- A. 口服胆囊造影                                  B. 静脉胆道造影                                  C. 经皮肝穿刺胆道造影  
D. 内镜逆行胰胆管造影                      E. 术后胆道镜检查
107. Murphy's 阳性多见于
- A. 胆总管结石                                      B. 胆道蛔虫病                                      C. 急性胰腺炎  
D. 急性胆囊炎                                      E. 肝内胆管结石
108. 对中心静脉压高、血压低休克病人, 应
- A. 大量输液, 加快滴速                                  B. 控制输液, 减慢滴速  
C. 暂停输液, 用强心剂                                  D. 补液试验, 舒张血管  
E. 适当补液, 收缩血管
109. 下列哪项不符合小脑幕切迹疝的表现
- A. 头痛剧烈、呕吐频繁、烦躁不安  
B. 呼吸骤停、瞳孔不变  
C. 病侧瞳孔缩小, 继而散大  
D. 脑疝对侧肢体运动障碍  
E. 进行性意识障碍
110. 下列哪项不符合枕骨大孔疝的临床特征?
- A. 剧烈头痛    B. 颈项强直    C. 强迫头位  
D. 生命体征紊乱                                  E. 早期出现意识障碍

111. 下列哪项属于不完全性骨折
- A. 青枝骨折                      B. 凹陷性骨折                      C. 压缩性骨折  
D. 斜形骨折                      E. 横形骨折
112. 肘关节脱位的特有体征是:
- A. 肿胀                      B. 疼痛                      C. 反常活动  
D. 肘后三点关系失常                      E. 杜加氏征阳性
113. 损伤性血胸胸腔内积血不凝固的原因是
- A. 多种凝血因子的减少                      B. 胸腔渗出液稀释  
C. 主要是凝血酶原减少                      D. 损伤后弥漫性血管内凝血  
E. 肺, 心及膈肌活动起去纤维蛋白的作用
114. 某女, 28 岁。因脊柱骨折致截瘫 1 个月。粪便秘结, 每 3-4 日排便 1 次。有排尿失禁现象。双下肢肌力明显减退, 浅感觉麻木。其截瘫指数为
- A. 1                      B. 2                      C. 3  
D. 4                      E. 5
115. 食管癌切除术后最常见、最严重的并发症是
- A. 脓胸                      B. 乳糜胸  
C. 吻合口瘘                      D. 吻合口狭窄  
E. 反流性食管炎
116. 引起骨筋膜室综合征的主要发病因素是
- A. 细菌繁殖过盛                      B. 骨筋膜室内压过高  
C. 肌肉痉挛                      D. 主干神经损伤  
E. 血管内膜损伤
117. 肘关节脱位的特有体征是:
- A. 肿胀                      B. 疼痛  
C. 反常活动                      D. 肘后三点关系失常  
E. 杜加氏征阳性
118. 腰椎间盘突出症术后病人进行直腿抬高练习的主要目的是
- A. 防止肌萎缩                      B. 防止关节僵硬  
C. 提高肌力                      D. 防止神经根粘连  
E. 早日下床活动
119. 急性血源性骨髓炎首发部位是
- A. 长骨的骨干                      B. 长骨的干骺端  
C. 长骨的骨膜                      D. 骨关节软骨处  
E. 骨髓腔
120. 骨巨细胞瘤的性质属于
- A. 良性                      B. 恶性                      C. 潜在恶性  
D. 高度恶性                      E. 性质不明

二. 多项选择题 (下列的每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 在每小题的备选答案中选出所有正确的答案, 写在答题纸上。共 30 题, 每题 2 分, 共 60 分)

多项选择题答题导引: 请严格按照以下格式 (5 小题一行), 把选项列在相应的题号后写在答题纸上。并注意字迹清晰。

1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ;  
6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ;  
.....

1. 关于二级预防, 正确的是:

- A. 又称病因预防      B. 又称临床前期预防      C. 又称临床期预防  
D. 是把健康问题的严重程度降到最低限度      E. 脑卒中的复发预防

2. 以下哪些症状是席尔认为的一般适应综合征:

- A. 头痛头晕      B. 皮肤潮红      C. 心跳加快  
D. 血压升高      E. 呼吸急促

3. 下列哪些疾病与生活方式密切相关:

- A. 肥胖      B. 高血压      C. 甲亢  
D. 糖尿病      E. 上消化道出血

4. 在护理程序实施中, 对于合作性问题, 护士的主要职责是:

- A. 监察病情      B. 及时发现并发症      C. 配合抢救  
D. 确定护理问题      E. 做好心理护理

5. Orem 自理模式中的治疗性自理需要包括:

- A. 运动时的自理需求      B. 一般的自理需求      C. 成长的自理需求  
D. 残疾时的自理需求      E. 健康欠佳时的自理需求

6. 对新入院病人进行交班时, 应在交班报告上写明:

- A. 发病经过      B. 主要症状      C. 病人主诉  
D. 既往病史      E. 病人直系亲属的过敏史

7. 衡量氧疗效果的主要观察体征有:

- A. 脉搏, 血压      B. 皮肤颜色      C. 意识  
D. 呼吸方式      E. 疼痛有无减轻

8. 洗胃时突然发生胃扩张可引起:

- A. 迷走神经兴奋      B. 反射性心跳骤停      C. 血压增高  
D. 增加毒物吸收      E. 促进毒物进入肠道

9. 以下哪项属于评判性思维的特点:

- A. 遵从专家的建议      B. 进行理性思考      C. 具有自主性  
D. 进行创造性思维      E. 能博采众长

10. 对下列哪些病人痰液观察, 极有助于相关疾病的临床诊断:

- A. 支气管扩张      B. 肺炎球菌肺炎      C. 急性肺水肿  
D. 慢性支气管炎      E. 肺结核

11. 肺结核化疗的原则, 下列哪项是正确的:
- A. 一旦发现和 (或) 确诊后应立即进行化疗
  - B. 要根据病情及不同药物的作用机制及其特点, 联合使用两种以上的药物
  - C. 应严格按照所选药物的适当剂量用药, 不宜剂量过大或过小
  - D. 要严格按照主诊医生制定的化疗方案, 按时、按量服 (用) 药
  - E. 未经主诊医生同意, 不宜随意停药、减 (加) 量和 (或) 自行更改化疗方案, 并应坚持完成规定的疗程
12. 病人男, 21 岁, 瘦长型体形, 因“大笑后突发左侧胸部撕裂性疼痛伴胸闷、气促 3 小时”而急诊留观, 作为值班护士, 你认为下列身体评估的内容, 哪项有助于你对该病人所患疾病的临床判断:
- A. 生命体征
  - B. 气管位置
  - C. 皮肤粘膜
  - D. 肺部叩诊与听诊
  - E. 胸部呼吸运动的观察
13. 下列哪种情况的病人, 其血压应该控制在  $\leq 130/80\text{mmHg}$ :
- A. 一般高血压病人
  - B. 老年高血压病人
  - C. 合并糖尿病的高血压病人
  - D. 合并慢性肾脏疾病或肾功能损害的病人
  - E. 合并心律失常的病人
14. 关于血压的相关表述, 下列哪些是正确:
- A. 理想的血压水平应为  $\leq 120/80\text{mmHg}$
  - B. 一般高血压病人血压有效控制的标准应为  $\leq 140/90\text{mmHg}$
  - C. 并发肾功能损害的高血压病人血压有效控制的标准应为  $\leq 130/80\text{mmHg}$
  - D. 并发糖尿病的高血压病人血压有效控制的标准应为  $\leq 130/80\text{mmHg}$
  - E. 高血压的诊断标准为  $\geq 140/90\text{mmHg}$
15. 消化性溃疡的发生与发展与下列哪些因素有关:
- A. 胃酸分泌过多
  - B. 胃蛋白酶的自我消化
  - C. 幽门螺杆菌感染
  - D. 服用非甾体类消炎药
  - E. 精神紧张
16. 下列疾病可因血小板数量的改变而诱发出血现象:
- A. 白血病
  - B. 肝硬化
  - C. 再障
  - D. 尿毒症
  - E. ITP
17. 关于肾性水肿的表述, 正确的是:
- A. 是肾小球疾病最常见的症状或体征之一
  - B. 肾炎性水肿主要与水钠潴留及毛细血管通透性增加有关
  - C. 肾病性水肿主要与血浆胶体渗透压下降有关
  - D. 肾炎性水肿多始于颜面部, 且多伴有高血压
  - E. 肾病性水肿多为全身性, 且有明显的血压升高
18. 对白血病病人进行口腔护理的目的与作用包括:
- A. 去除口臭
  - B. 擦除血痂
  - C. 增进食欲
  - D. 预防感染
  - E. 增加病人的舒适感

19. 导致血液病病人死亡的主要原因包括:
- A. 心力衰竭                      B. 颅内出血                      C. 全身衰竭  
D. 败血症                          E. 发热
20. 关于对传染源的管理, 正确的是:
- A. 一旦发现传染病人或疑似病人, 应立即隔离治疗  
B. 对传染病接触者可根据具体情况分别采取医学观察、留验或卫生处理  
C. 对病原携带者应做到早期发现, 定期随访, 必要时应根据工作性质及具体情况作出必要的工作调整和(或)隔离治疗  
D. 对动物传染源应根据动物的病种和经济价值, 予以隔离、治疗或杀灭  
E. 对于鼠类及狂犬等动物性传染源, 应予杀灭和焚毁
21. 下列哪种传染病的传播媒介与蚊子叮咬有关:
- A. 流行性乙型脑炎                      B. 肾病综合征出血热                      C. 登革热  
D. 疟疾                                  E. 艾滋病
22. 颅前窝损伤时, 可累及的脑神经是
- A. 视神经                                  B. 听神经                                  C. 面神经  
D. 嗅神经                                  E. 滑车神经
23. 急性腹膜炎手术治疗的适应证包括
- A. 原发性腹膜炎                                  B. 胃溃疡穿孔  
C. 胃肠吻合口瘘                                  D. 原因不明腹膜炎, 无局限趋势  
E. 非手术治疗 6~8 小时, 腹膜炎症状及体征无缓解者
24. 下列外科感染中, 需行隔离的是
- A. 疖    B. 丹毒    C. 破伤风  
D. 急性淋巴管炎                                  E. 厌氧菌所致的蜂窝织炎
25. 下列肾损伤中, 需行手术治疗的是
- A. 开放性肾损伤                                  B. 肾破裂    C. 肾挫伤  
D. 肾蒂伤    E. 肾碎裂伤
26. 石膏绷带固定术后病人的护理, 下列正确的是
- A. 术后 8 小时内病人勿翻身  
B. 手足趾露出石膏外以利观察血运  
C. 搬动未干石膏时应用手扶托  
D. 有局限性疼痛时应往石膏管内填塞棉花  
E. 固定肢体应作肌肉和关节运动
27. 机械性肠梗阻肠管局部的病理生理变化包括:
- A. 肠管扩张                                  B. 肠腔积气积液                                  C. 肠蠕动减弱  
D. 肠壁血运障碍                                  E. 肠壁充血水肿
28. 对胆道疾病病人的护理:
- A. 给予低脂饮食  
B. 疼痛剧烈首选吗啡  
C. 黄疸病人, 口服维生素 K

- D. 经皮肝穿刺胆管造影前须作碘过敏试验
- E. 造影检查日晨禁食

29. 有关脑挫裂伤的表现

- A. 昏迷多数超过 30 分钟
- B. 严重者可长期持续昏迷
- C. 常有局灶症状与体征
- D. 脑脊液检查无红细胞
- E. 可出现脑膜刺激征

30. 下列哪些是骨折晚期并发症:

- A. 畸形愈合
- B. 骨化性肌炎
- C. 缺血性骨坏死
- D. 骨筋膜室综合征
- E. 脂肪栓塞

三. 病例分析 (请将答案写在答题纸上. 共 3 题, 每题 20 分, 共 60 分)

1. 病人, 男, 45 岁, 因“右上腹痛 3 周, 尿黄伴皮肤黄染 2 周”, 拟“肝细胞性肝癌”收入院。现病人仍有上腹部隐痛不适, 疼痛尚能忍受, 无其他部位放射痛, 无腹胀、纳差、乏力、呕吐等不适, 食欲、睡眠尚可。生命体征稳定, 神志清楚, 巩膜中度黄染。经完善各项术前检查, 拟行“肝门部肿瘤根治术+胆管空肠吻合术”, 现护士于病人手术日晨执行术前医嘱: 胃肠减压; 留置导尿管。请问: (1) 护士为病人术前插胃管的注意事项有哪些? 与鼻饲法的胃管插管有何不同? (2) 护士为病人术前插导尿管的注意事项有哪些? 为该病人留置气囊导尿管还需注意哪些问题?

2. 病人, 男, 32 岁, 司机。约于 5 年多前起, 由于工作原因, 时常出现饱一餐饿一餐的现象。渐觉上腹隐痛不适, 以空腹时为甚, 间有反酸、嗝气, 进食、饮热的食物或自服“胃药”后, 症状均有所缓解, 一直未以重视。2 天前, 因连续加班工作, 导致上述症状明显加重, 同上处理效果欠佳, 但仍未以注意, 一直坚持工作。1 天前, 突觉恶心并连续呕吐咖啡色样胃内容物两次, 量约 600ml, 排柏油样糊状便 3 次, 量约 800ml; 并觉头晕脚软、心跳心慌, 且尿量见少, 即到我院急诊, 拟为“上消化道出血原因待查”而车床送入院。身体评估: T 36℃, P 112 次/分, R 32 次/分, Bp 90/60mmHg; 神情淡漠, 面色苍白, 肢端冰凉; 皮肤、粘膜无黄染、出血点及蜘蛛痣; 双肺未闻罗音; 心率 112 次/分, 律整; 各瓣膜听诊区未闻病理性杂音; 腹平软, 上腹部有轻触痛, 无反跳痛; 肝脾未及; 腹水征(-); 肠鸣音亢进。试针对本病例提出 3 个主要的护理诊断, 并制定出相应的护理措施

3. 某女, 56 岁, 突发上腹部阵发性绞痛伴恶心呕吐 5h 来院急诊。体查: T 37℃, P 80 次/分, R 19 次/分, BP 116/74mmHg。急性病容, 唇舌干燥, 眼窝凹陷, 皮肤弹性差。腹稍胀, 未见肠型及蠕动波, 腹式呼吸减弱, 下腹部轻度压痛, 叩诊鼓音, 移动性浊音阴性, 听诊肠鸣音亢进。实验室检查: 血红蛋白、红细胞计数和红细胞比容均升高, 血清钾 2.6mmol/L, 血清钠 137mmol/L。病人及其家属非常担忧, 不停问护士病情是否严重, 需否手术。诉半年前曾因胃穿孔做过胃大部分切除术。请问: (1) 首先考虑的疾病是? 主要依据? (2) 病人是否存在电解质酸碱失衡? 哪一种? 主要的处理原则? (3) 病人暂采取非手术治疗, 列出主要的护理问题 (4 个) 及相应的护理措施? (4) 病情观察中, 病人出现哪些情况提示病情严重, 需马上手术处理?