

中山大学

二〇一一年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码: 308

科目名称: 护理综合

考试时间: 1月16日上午

考生须知

全部答案一律写在答题纸上, 答在试题纸上的不计分! 请用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。答题要写清题号, 不必抄题。

一、单项选择题(下列的每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案, 请从中选择一个最合适的答案, 写在答题纸上。共 90 题, 每题 2 分, 共 180 分)

单项选择题答题导引: 请严格按照以下格式(10 小题一行), 把选项列在相应的题号后写在答题纸上。并注意字迹清晰。

1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ; 6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ;
11. ; 12. ; 13. ; 14. ; 15. ; 16. ; 17. ; 18. ; 19. ; 20. ;

1. 在 Roy 适应模式的护理程序中, 一级评估是:

- A. 影响因素评估 B. 行为评估 C. 角色评估
D. 将各种刺激分类 E. 识别主要刺激

2. Neuman 系统模式对人整体性的描述与护理学基本概念对人整体性描述的比较, 突出以下哪一变量:

- A. physiological B. psychological C. sociocultural
D. spiritual E. development

3. 以下哪一种健康教育模式为主要用于指导卫生保健人员鉴别影响人们健康决策和行为因素的健康模式:

- A. 保健教育过程模式 B. 健康促进模式 C. 自我调节模式
D. 健康信念模式 E. 知行信模式

4. 患者李先生, 行胃大部分切除, 术后护士为其取半坐卧位的最主要目的是:

- A. 预防腹膜粘连 B. 改善局部血供 C. 减轻心脏负担
D. 减轻伤口张力 E. 促进气体交换

5. 患者刘姨, 住院第二天, 主管护士查房时刘姨说: “感觉不舒适, 难以入睡”。护士给其提供护理时首先应:

- A. 嘱其卧床休息 B. 建立良好护患关系 C. 采取有效的措施
D. 提供舒适的环境 E. 查明其不舒适的原因

6. 患者卢先生, 因骨折肢体被固定, 早期护士应指导其进行以下哪项治疗护理措施:

- A. 关节运动范围练习 B. 肌肉等张练习 C. 肌肉动力练习
D. 肌肉等长练习 E. 绝对卧床休息

7. 对于全身瘫痪患者, 应定期帮助其进行以下何种练习, 以预防关节僵硬:

- A. Isotonic exercise B. 肌肉静力练习 C. Isometric exercises
D. 肌肉动力练习 E. ROM 练习

8. 哪种环境要求医务人员手细菌菌落总数 $\leq 15\text{cfu/cm}^2$:

- A. I 类环境 B. II 类环境 C. III 类环境
D. IV 类环境 E. V 类环境

9. 为避免发生继发效应, 冷热疗法一般的治疗时间为:

- A. 5~15 分钟 B. 20~30 分钟 C. 30~45 分钟
D. 45~60 分钟 E. 60 分钟以上

10. 因服毒而出现严重中毒的患者, 洗胃时应采取的体位为:

- A. 坐位 B. 半坐卧位 C. 右侧卧位
D. 左侧卧位 E. 平卧位

11. 在抢救患者过程中, 对于口头医嘱, 正确的处理方法是:

- A. 听到后, 立即执行 B. 对医生复述一遍, 无误, 立即执行
C. 等医生写出医嘱, 立即执行 D. 等医嘱打印到治疗本上, 立即执行
E. 两个护士一起执行

(病例 1 为 12~14 题共用)

病例 1: 患者, 李某, 女, 62 岁, 因“急性肺炎”收入院。现患者仍咳嗽、咳痰, 痰液黄色粘稠。医嘱: 止咳糖浆 10ml po, tid; 必漱平 16 mg po, tid.....

12. 药疗护士派发口服药时, 以下哪项不妥:

- A. 应核对小药牌、床号、床头卡 B. 呼唤患者姓名, 发给应答者
C. 每个患者的所有药物应一次取离药盘 D. 亲自看到患者服下药物
E. 如患者对服药提出疑问, 应重新查核

13. 在给该患者发药时, 主要指导患者:

- A. 饭前服药, 止咳糖浆与必漱平一起服 B. 饭后服药, 止咳糖浆与必漱平一起服
C. 先服止咳糖浆, 后服必漱平, 服药后多饮水 D. 先服必漱平, 后服止咳糖浆, 服药后多饮水
E. 先服必漱平, 后服止咳糖浆, 服药后不宜立即饮水

14. 在执行该患者的医嘱时, 以下做法不正确的是:

- A. 发药前须请另一护士再次核对 B. 按医嘱要求给患者按时给药
C. 可根据病情自行加大止咳糖浆量 D. 应确认患者服下药物后方可离开
E. 如患者不在, 应将药物带回保管

(病例 2 为 15~17 题共用)

病例 2: 患者, 刘某, 心血管疾病, 护士在听其心音时发现其心音强弱不等、心律不规则、心率快慢不一。

15. 该患者可能出现什么情况:

- A. 间歇脉 B. 交替脉 C. 脉搏短绌
D. 奇脉 E. 不规则脉

16. 对于上述情况, 以下哪一处理方法正确:

- A. 报告医生处理
- B. 再次测量、核实脉搏后报告医生
- C. 再次测量、核实心率后报告医生
- D. 两护士同时、分别测量心率、脉率
- E. 再次测量、核实心音后报告医生

17. 对上述测量结果的文字记录方式, 哪项是正确的:

- A. 心率: 以红点表示
- B. 心率/脉率
- C. 脉率: 以红圈表示
- D. 脉率/心率
- E. ●/○

(病例 3 为 18~20 题共用)

病例 3: 李大伯因慢性阻塞性肺气肿合并肺部感染入院, 护士在给其做入院评估时发现其气促、痰多, 他告诉护士自己感到胸闷、心悸、口渴。

18. 作为护士, 根据患者的情况及急救的基本常规, 在医生未到之前应首先:

- A. 建立静脉通道、准备急救
- B. 指导患者多喝水稀释痰液
- C. 实施心理护理、耐心等待医生到达
- D. 给其先吸痰、后吸氧
- E. 什么都不能做(没有医嘱)

19. 如果护士给该患者单侧鼻导管中心吸氧, 以下连贯操作手法哪项不正确:

- A. 测量氧管插入长度、做标记
- B. 连接氧管与输氧胶管
- C. 插管一固定一调流量
- D. 交代注意事项
- E. 记录

20. 当李大伯出现 II 型呼吸衰竭时, 高浓度吸氧会导致:

- A. 恶心、呕吐
- B. 烦躁不安
- C. 进行性呼吸困难
- D. 二氧化碳麻醉
- E. 面色苍白

(病例 4 为 21~23 题共用)

病例 4: 患者, 李某, 女性, 58 岁, 因患子宫肌瘤住院准备行子宫切除术, 现遵医嘱: 用双腔气囊导尿管给患者留置导尿。

21. 为该患者术前留置导尿管的目的是:

- A. 放出尿液, 解除痛苦
- B. 保持会阴部清洁干燥
- C. 收集尿液作培养
- D. 排空膀胱, 避免术中损伤
- E. 测定残余尿

22. 如果护士在给该患者插尿管时误插进阴道, 正确的处理方法是:

- A. 拔出尿管后重插
- B. 拔出尿管后, 休息片刻再插
- C. 拔出尿管后, 消毒尿道口再插
- D. 拔出尿管后, 作好解释工作再插
- E. 拔出尿管后, 应更换无菌导尿管后再插

23. 为该患者插尿管时插入的深度是:

- A. 插入 4~6cm 见尿后再插入 1~2cm
- B. 插入 4~6cm 见尿后再插 7~10cm
- C. 插入 8~12cm 见尿后再插入 1~2cm
- D. 插入 8~12cm 见尿后再插 7~10cm
- E. 插入 12~16cm 见尿后再插入 1~2cm

(病例 5 为 24~25 题共用题干)

病例 5: 患者, 男, 75 岁, 因脑卒中(中风)住院, 体重 80 公斤, 身高 1.70 米, 患者昏迷。医嘱指示停留胃管。

24. 护士在操作中哪项不正确:

- A. 向家属解释插管目的和意义
- B. 取下活动假牙
- C. 撤去枕头
- D. 插管长度是发际至胸骨剑突的距离
- E. 当胃管插入 15 厘米时, 将患者额头靠近胸骨柄, 缓慢插入胃管

25. 按照体重指数(BMI)的中国标准, 请你判断其是:

- A. 明显消瘦
- B. 消瘦
- C. 正常
- D. 超重
- E. 肥胖

26. 输液过程出现空气栓塞, 患者应采取的体位是:

- A. 半卧位
- B. 右侧卧位, 头高脚低
- C. 俯卧位
- D. 左侧卧位, 头低脚高
- E. 仰卧位

27. 以下哪项不属于住院患者睡眠的特点:

- A. 睡眠减少
- B. 睡眠过度
- C. 睡眠中断
- D. 诱发补偿现象
- E. 昼夜性节律去同步化

28. 大量咯血患者需绝对卧床休息, 应考虑给予的体位是:

- A. 头低脚高位
- B. 头偏一侧平卧位
- C. 患侧卧位
- D. 健侧卧位
- E. 半卧位

29. 确定为呼吸衰竭的血气分析指标是, 动脉血氧分压低于:

- A. 80mmHg
- B. 70mmHg
- C. 60mmHg
- D. 50mmHg
- E. 40mmHg

30. 关于肺癌患者疼痛的护理, 不恰当的是:

- A. 动态评估患者的疼痛特点
- B. 避免各种可能加重疼痛的诱因
- C. 指导患者学习物理止痛技术
- D. 止痛时先考虑使用安慰剂
- E. 积极应用止痛药物

31. 关于气胸的临床表现, 哪项错误:

- A. 胸痛
- B. 气促
- C. 患侧胸廓饱满
- D. 患侧语颤增强
- E. 患侧呼吸音消失

32. 气胸闭式引流的护理, 错误的是:

- A. 患者取半卧位
- B. 引流瓶应放置在胸部平面以下
- C. 嘱患者避免深呼吸或咳嗽
- D. 保持引流管的通畅
- E. 定时更换引流瓶

33. 目前认为控制支气管哮喘发作最有效的药物是:

- A. 服用茶碱类制剂
- B. 服用 β_2 受体激动剂
- C. 使用肾上腺皮质激素雾化吸入剂
- D. 使用抗胆碱能药物雾化吸入剂
- E. 使用色苷酸钠雾化吸入剂

34. 心瓣膜病变晚期最常见的并发症及主要死因是:

- A. 心力衰竭 B. 感染性心内膜炎 C. 心律失常
D. 呼吸道感染 E. 脑栓塞

35. 患者在活动时心绞痛发作, 首选的处理措施是:

- A. 立即舌下含服硝酸甘油 B. 立即停止一切活动
C. 立即吸氧 D. 立即注射安定
E. 立即到医院急诊

36. 关于高血压病的叙述下列哪项是错误的:

- A. 主要是指不明原因的动脉血压增高
B. 对机体的危害主要是造成重要器官的损害和功能衰竭
C. 一旦检查发现血压 $\geq 160/90\text{mmHg}$, 即可确诊
D. 一旦确诊, 多需终身治疗
E. 低盐饮食是非药物治疗的重要措施

37. 关于心肌炎患者的护理哪项是错误的:

- A. 少量多餐, 注意增加维生素 C 的摄入
B. 早期即应鼓励患者多活动, 以防止各种并发症的发生
C. 必须保持二便通畅
D. 注意观察患者活动时的心率及心律变化
E. 注意控制补液速度

38. 某心脏病患者, 主诉心悸、呼吸困难。查体: $T 36.8^{\circ}\text{C}$, $R 32$ 次/分, $P 112$ 次/分, $Bp 110/65\text{mmHg}$, 神志清, 半坐卧位。该患者的心功能分级应为:

- A. I 级 B. II 级 C. III 级
D. IV 级 E. V 级

39. 某患者的 ECG 表现如下图所示, 提示其心律失常可能是:



- A. 房性早搏 B. 室性早搏 C. 房室交界性早搏
D. 室速 E. 室上速

40. 患者有消化性溃疡病史多年, 昨夜开始出现呕血和排黑便多次, 今晨家人发现其神情恍惚、面色苍白、四肢湿冷而送入院。依据患者的临床表现, 提示其出血量为:

- A. $< 500\text{ml}$ B. $500 \sim 800\text{ml}$ C. $800 \sim 1000\text{ml}$
D. $> 1000\text{ml}$ E. $> 2000\text{ml}$

41. 以下关于慢性胃炎的饮食指导, 不恰当的是:

- A. 多吃粗纤维食物 B. 养成细嚼慢咽的进食习惯
C. 戒除吸烟和饮烈酒 D. 少吃辛辣食物
E. 避免暴饮暴食

42. 以下哪项不符合十二指肠溃疡疼痛的特点:

- A. 多在餐后 2~3 小时发作 B. 常有夜间发作
C. 性质多为烧灼样 D. 部位多在上腹正中或偏右
E. 在下次进餐前多能自行缓解

43. 溃疡性结肠炎的主要临床表现不包括:

- A. 腹泻 B. 腹痛 C. 腹胀
D. 腹部包块 E. 发热

44. 医嘱给予肝性脑病患者清洁灌肠, 最好选用哪种溶液:

- A. 肥皂水 B. 生理盐水 C. 2% 碳酸氢钠溶液
D. 食醋溶液 E. 温开水

45. 普查原发性肝癌最常选用的检查项目是:

- A. 电子计算机体层扫描 B. 甲胎蛋白检测
C. B 型超声波 D. 肝穿刺活检
E. 丙氨酸氨基转移酶测定

46. 质子泵抑制剂治疗消化性溃疡的作用机制是:

- A. 抑制壁细胞 $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - \text{ATP}$ 酶的活性 B. 抑制组胺 H_2 受体
C. 抗胆碱能神经 D. 抗胃泌素受体
E. 保护胃黏膜

47. 关于肾病综合征患者的治疗, 下列哪项是错误的:

- A. 激素等免疫抑制剂的应用, 是治疗的关键
B. 激素的应用原则为起始足量、减量要慢、疗程要长
C. 患者出现肾功能不全时, 应给予优质高蛋白饮食
D. 大多数患者需用降脂药物
E. 应限制水、盐的摄入

48. 慢性肾炎患者出现哪种症状时, 要注意有并发尿毒症的可能:

- A. 头晕、头痛 B. 厌食、恶心、呕吐 C. 乏力、嗜睡
D. 烦躁不安 E. 不能平卧

49. 通常的情况下, 血小板低于多少时, 患者容易有出血症状:

- A. $100 \times 10^9/\text{L}$ B. $80 \times 10^9/\text{L}$ C. $70 \times 10^9/\text{L}$
D. $50 \times 10^9/\text{L}$ E. $30 \times 10^9/\text{L}$

50. 急性再生障碍性贫血患者, 血小板 $18 \times 10^9/\text{L}$, 在剧烈咳嗽后突然感到视力模糊、头痛, 并伴有喷射性呕吐、呼吸加快, 你估计患者发生了:

- A. 气胸 B. 急性心力衰竭 C. 颅内出血
D. 急性胃炎 E. 脑血管痉挛

51. 在临床上引起贫血最常见的原因是:

- A. 生成红细胞的原料不足 B. 骨髓生成红细胞的能力障碍
C. 红细胞破坏增多 D. 红细胞大量丢失
E. 红细胞寿命缩短

52. 白血病化疗期间, 嘱患者多饮水的主要目的是:

- A. 维持血容量
- B. 有利于化疗药降解产物的排泄
- C. 减轻骨髓抑制
- D. 减轻肝损害
- E. 降低血液中的药液浓度

53. Graves 病的患者出现甲状腺肿大, 以下哪项不正确:

- A. 肿大多为弥漫性、对称性
- B. 肿大程度与甲亢轻重有明显的关系
- C. 甲状腺可以随吞咽动作上下移动
- D. 甲状腺质软, 无压痛
- E. 左右叶上下极可有振颤或血管杂音

54. Cushing 综合征出现体液过多时, 饮食上应该:

- A. 低钠、高钾、高蛋白、低碳水化合物、低热量
- B. 低钠、低钾、低蛋白、高碳水化合物、高热量
- C. 低钠、高钾、高蛋白、高碳水化合物、高热量
- D. 低钠、低钾、高蛋白、高碳水化合物、高热量
- E. 低钠、高钾、低蛋白、低碳水化合物、低热量

55. II 型糖尿病患者并发酮症酸中毒的常见诱因一般不包括:

- A. 胰岛素治疗中断
- B. 饮食不当
- C. 创伤、手术
- D. 急性呼吸衰竭
- E. 妊娠、分娩

56. 糖尿病患者使用胰岛素治疗, 可能出现的胰岛素不良反应一般不包括:

- A. 肾功能衰竭
- B. 低血糖反应
- C. 荨麻疹样皮疹
- D. 注射部位脂肪萎缩
- E. 注射部位脂肪增生

57. 关于 OGTT 实验, 护士应该向患者做的卫生宣教不包括:

- A. 试验前 3 天每天进食碳水化合物量不可少于 150 g
- B. 应在清晨进行
- C. 试验前 10h 禁食
- D. 试验日空腹取血测血糖
- E. 儿童口服葡萄糖量为 0.75g/kg

58. 关于 SLE 患者的饮食护理, 正确的是:

- A. 多食无花果、蘑菇等食物
- B. 鼓励进食高糖、低蛋白、高维生素饮食
- C. 鼓励进食低糖、低蛋白、低维生素饮食
- D. 鼓励进食高糖、高蛋白、高维生素饮食
- E. 不宜少食多餐

59. 关于类风湿结节的叙述以下错误的是:

- A. 一般质地柔软
- B. 深部结节可出现于肺部
- C. 浅表结节多在关节隆突部位皮下
- D. 圆形或卵圆形
- E. 一般无压痛

60. 关于短暂性脑缺血发作的表现下列哪项不符:

- A. 好发于老人
- B. 发作突然
- C. 历时短暂
- D. 局灶性脑功能障碍
- E. 不能完全恢复

61. 抗癫痫药物最好的服药时间是:

- A. 饭前
- B. 晨起
- C. 空腹
- D. 饭后
- E. 睡前

62. 脑出血患者应取的体位是:

- A. 头低足高位
- B. 仰卧抬高床头 15°-30°
- C. 侧卧抬高床头 15°-30°
- D. 去枕侧卧位
- E. 俯卧位

63. 蛛网膜下腔出血最常见的病因为:

- A. 先天性动脉瘤
- B. 动静脉畸形
- C. 高血压性动脉硬化
- D. 血液病
- E. 脑动脉炎

64. 下列不符合代谢性碱中毒特点的是:

- A. 血 pH>7.45
- B. 血 [HCO₃⁻] ↑
- C. 血 CO₂CP ↓
- D. BE 正值增高
- E. 尿 pH>6

65. 某高热患者, 极度口渴、尿量减少, 唇干, 皮肤弹性差, 眼窝凹陷。最可能为哪种程度、哪种类型的脱水?

- A. 轻度高渗性脱水
- B. 中度高渗性脱水
- C. 轻度等渗性脱水
- D. 中度等渗性脱水
- E. 中度低渗性脱水

66. 某感染性休克患者经扩容后, 测其中心静脉压 (CVP) 20cmH₂O, 血压 80/50mmHg, 应考虑为:

- A. 血容量严重不足
- B. 动静脉短路开放
- C. 右心功能不全
- D. 容量血管收缩过度
- E. 容量血管扩张过度

67. 某男, 45 岁, 颅脑外伤后昏迷, 有“中间清醒期”, 提示最可能是:

- A. 脑震荡
- B. 脑挫裂伤
- C. 硬脑膜外血肿
- D. 急性硬脑膜下血肿
- E. 脑内血肿

68. 某男, 37 岁, 患胃溃疡 9 年。行毕 II 式胃大部切除术后第 6 日, 突发右上腹剧痛, 腹部有明显压痛、反跳痛和腹肌紧张。首先考虑并发了:

- A. 吻合口出血
- B. 急性输入襻梗阻
- C. 倾倒综合征
- D. 吻合口梗阻
- E. 十二指肠残端破裂

69. 某男, 34 岁, 胫腓骨骨折, 入院第 2 天患者出现小腿剧痛、进行性加重, 严重肿胀, 足趾麻木, 足背动脉搏动微弱等症。该患者可能发生了:

- A. 休克
- B. 脂肪栓塞
- C. 腓总神经损伤
- D. 关节僵硬
- E. 急性骨筋膜室综合征

70. 下列甲亢患者中, 不宜行手术治疗的是:

- A. 青少年甲亢
- B. 继发性甲亢
- C. 中度以上的原发性甲亢
- D. 腺体较大, 伴压迫症状者
- E. 抗甲状腺药物治疗后复发者

71. 胆囊结石患者禁用吗啡止痛的主要原因是避免:

- A. 引起呼吸抑制
- B. 引起呕吐
- C. 引起 Oddi 括约肌收缩
- D. 引起胃肠功能紊乱
- E. 引起头晕头痛

72. 某男, 15 岁, 下肢疼痛 3 个月, X 线检查见胫骨骺端骨质破坏, 出现“Codman 三角”和“日光射线”。提示为:

- A. 急性化脓性骨髓炎
- B. 膝关节结核
- C. 骨软骨瘤
- D. 骨巨细胞瘤
- E. 骨肉瘤

73. 烧伤的现场急救, 下列错误的是:

- A. 用大量冷水冲淋伤处
- B. 心跳呼吸停止者, 就地实施心肺复苏
- C. 合并一氧化碳中毒者给予吸氧
- D. 迅速把贴身衣服撕脱开
- E. 酌情用哌替啶、吗啡止痛

74. 某男, 50 岁, 不慎跌倒在地, 右侧髌部疼痛, 站立和走路时疼痛更为明显。为明确诊断, 应行下列哪项检查:

- A. B 超
- B. CT
- C. X 线
- D. 骨扫描
- E. MRI

75. 某男, 52 岁, 4 天前不慎刺伤左手食指末节指腹, 现刺伤局部出现肿胀、呈搏动性跳痛, 手下垂时疼痛加重, 患处皮肤苍白。最主要的处理措施是:

- A. 继续观察
- B. 用镇痛药
- C. 应用抗生素
- D. 局部热敷
- E. 局部切开减压

76. 痔形成的因素中, 下列哪项无关:

- A. 直肠上静脉无静脉瓣
- B. 直肠上、下静脉丛畸形
- C. 肛周慢性感染
- D. 腹内压增高
- E. 静脉周围组织松弛对静脉丛支持不力

77. 骑跨伤多发生于:

- A. 尿道球部
- B. 尿道阴茎部
- C. 尿道膜部
- D. 尿道前列腺部
- E. 阴茎悬垂部

78. 下列属稳定性骨折的是:

- A. 横断骨折
- B. 楔形骨折
- C. 螺旋形骨折
- D. 粉碎性骨折
- E. 撕脱性骨折

79. 休克代偿期相当于休克病理生理分期的哪一期:

- A. 微循环收缩期
- B. 微循环扩张期
- C. 微循环衰竭期
- D. 正常微循环
- E. 微循环代偿期

80. 张力性气胸的主要病理生理变化是:

- A. 连枷胸
- B. 纵膈扑动
- C. 胸壁反常呼吸运动
- D. 纵膈向健侧移位
- E. 肺内气体对流

81. 骨关节结核最常见的发病部位是:

- A. 脊柱
- B. 膝关节
- C. 髋关节
- D. 肘关节
- E. 踝关节

82. 早期发现前列腺癌的检查是:

- A. 血清甲胎蛋白 (AFP)
- B. 血清癌胚抗原 (CEA)
- C. 血清前列腺特异抗原 (PSA)
- D. 直肠指检
- E. B 超

83. 开放性损伤中, 最易受损伤的腹内脏器是:

- A. 肝
- B. 脾
- C. 胃
- D. 肾
- E. 小肠

84. 机械性肠梗阻的病理生理特点, 下列错误的是:

- A. 肠腔积液、积气
- B. 肠蠕动减慢
- C. 肠管壁静脉回流受阻
- D. 电解质紊乱、代谢性酸中毒
- E. 腹膜炎和感染性休克

85. 肛裂三联征是指:

- A. 肛裂、前哨痔、肥大乳头
- B. 肛裂、内痔、肥大乳头
- C. 肛裂、血栓性外痔、肥大乳头
- D. 血栓性外痔、肛裂、肛周脓肿
- E. 前哨痔、肥大乳头、肛周脓肿

86. 软化区广泛的连枷胸可导致:

- A. 张力性气胸
- B. 闭合性气胸
- C. 血胸
- D. 纵膈摆动
- E. 休克

87. 某患儿, 肠套叠 20h, 主要的处理措施是:

- A. 禁食
- B. 胃肠减压
- C. 空气灌肠复位
- D. 手法复位
- E. 手术复位

88. 下肢静脉曲张最根本的治疗方法是:

- A. 绑弹力绷带
- B. 穿弹力袜
- C. 高压氧治疗
- D. 手术治疗
- E. 硬化剂注射疗法

89. 粘连性肠梗阻腹部 X 线检查常可见:

- A. 膈下游离气体
- B. “杯口状”或“弹簧状”阴影
- C. 气液平面
- D. 龛影
- E. “鸟嘴状”阴影

90. 嵌顿性疝与绞窄性疝的主要区别是:

- A. 嵌顿时间不同
- B. 病因不同
- C. 有无肠梗阻症状
- D. 受累及脏器不同
- E. 受累及肠管壁有无血供障碍

二、多项选择题（下列的每道题有 A、B、C、D、E 五个备选答案，在每小题的备选答案中选出所有正确的答案，写在答题纸上。共 20 题，每题 3 分，共 60 分）

多项选择题答题导引：请严格按照以下格式（5 小题一行），把选项列在相应的题号后写在答题纸上。并注意字迹清晰。

1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. ;
6. ; 7. ; 8. ; 9. ; 10. ;
.....

1. 对角色理论的正确理解包括：

- A. 角色的实现必须通过互动才能得以完成 B. 角色行为由集体完成
C. 角色可以相互转变 D. 任何角色在社会中都不是孤立存在的
E. 人的一生中会获得多种角色

2. 医疗事故的防范措施包括：

- A. 强化法制观念，严格遵守各项规章制度
B. 加强学习，提高业务技术水平
C. 注重终末质量管理
D. 对具有风险性的诊治措施，应与患者及其家属进行口头交代
E. 严格执行医疗事故上报制度，及时总结经验教训

3. 对影响血压的因素，理解确切的是：

- A. 舒张压的大小主要反映每搏输出量的大小
B. 大动脉的弹性对血压起缓冲作用
C. 舒张压的增高主要反映外周阻力的大小
D. 血液粘稠度增高，外周阻力会增大
E. 循环血量和血管容积是形成血压的重要前提

4. 肠胀气患者的饮食应注意：

- A. 勿食用豆类食物 B. 选用易消化食物 C. 少饮汽水
D. 多吃高糖类食物 E. 进时要细嚼慢吞

5. 防止输血引起溶血反应的措施是：

- A. 做好血型鉴定 B. 做好交叉配血试验
C. 严格执行血液保存规则 D. 输血前要先由两人认真核对
E. 避免血液加热或剧烈震荡

6. 对濒死患者的心理护理，应做到：

- A. 理解患者的心理要求 B. 尽量满足患者的意愿
C. 认真倾听患者的心理感受 D. 对患者否认期言行应好心矫正
E. 语言亲切，照顾要周到

7. 关于肺结核病的预防，保护易感人群的措施有：

- A. 患者不可面对他人咳嗽 B. 密切接触者需定期检查
C. 对易感者行预防性化学治疗 D. 早期发现患者及时化学治疗
E. 新生儿接种卡介苗

8. 支气管哮喘的激发因素有：

- A. 花粉 B. 感染 C. 牛奶
D. 心得安 E. 气候改变

9. 与肺癌有关的因素包括：

- A. 吸烟 B. 维生素 A C. 焦油
D. 空气污染 E. 电离辐射

10. 下列哪些是洋地黄中毒的表现：

- A. 室性期前收缩 B. 房性期前收缩 C. 多尿
D. 食欲下降 E. 视力模糊

11. 能使心肌梗死患者闭塞的冠状动脉再通的措施有：

- A. 冠脉介入治疗 B. 含服硝酸甘油
C. 静脉滴注尿激酶 D. 安装起搏器
E. 静脉注射吗啡

12. 老年人消化性溃疡的特点是：

- A. 溃疡常较小 B. 临床表现不典型 C. 需与胃癌鉴别
D. 疼痛多无规律 E. 较少出现消瘦贫血

13. 炎性肠病的病因和发病机制有：

- A. 环境因素 B. 遗传因素 C. 结核分支杆菌
D. 麻疹病毒 E. 免疫因素

14. 慢性肾小球肾炎的饮食原则包括：

- A. 优质低蛋白 B. 低钙 C. 低磷
D. 低盐 E. 高热量

15. 急性胆囊炎的致病因素包括：

- A. 胆囊管梗阻 B. 肠管梗阻 C. 肝内胆管梗阻
D. 致病菌入侵 E. 创伤和化学刺激

16. 脑疝的急救处理，正确的是：

- A. 保持呼吸道通畅、吸氧 B. 应用激素
C. 经静脉缓慢滴入 20%甘露醇 D. 腰椎穿刺、降低颅压
E. 做好紧急手术减压的准备

17. 下列符合绞窄性肠梗阻临床特点的是：

- A. 持续性剧烈腹痛、阵发性加重 B. 频繁呕吐
C. 明显腹胀 D. 胃肠抽出液为血性
E. 腹部 X 线检查见孤立、固定的肠襻

18. 胸部损伤患者的护理, 下列哪些征象提示其有胸膜腔活动性出血:

- A. 胸腔闭式引流液为血性
- B. 血红蛋白、红细胞计数、血细胞比容持续降低
- C. 血压虽短暂回升, 又迅速下降
- D. 胸膜腔穿刺抽出血液很快凝固
- E. 胸部 X 线示胸膜腔阴影继续增大

19. 牵引的目的与作用包括:

- A. 骨折、脱位的复位和固定
- B. 防止神经损伤
- C. 肢体制动, 减轻疼痛
- D. 矫形治疗
- E. 防止畸形和病理性骨折

20. 下列乳房疾病中, 需行手术治疗的是:

- A. 急性乳房炎早期
- B. 乳腺癌
- C. 乳房纤维瘤
- D. 乳管内乳头状瘤
- E. 乳腺囊性增生病局部病灶有恶性变者

三. 病例分析 (请将答案写在答题纸上, 共 5 题, 每题 12 分, 共 60 分)

1. 患者卢某, 男性, 67 岁, 胆囊切除术后合并肺部感染。今天上午静脉输入 300ml 血浆和 5% 葡萄糖氯化钠溶液 1000ml 后, 出现胸闷、气促、发绀, 咳出大量泡沫样血性痰, 烦躁不安, 听诊双肺布满湿性啰音, 心率 124 次/分, BP 148/88 mmHg。请问:

- (1) 该患者出现了什么问题?
- (2) 导致该问题的可能原因是什么?
- (3) 针对该问题应如何处理?

2. 患者, 男, 38 岁, 销售员。突发剧烈上腹绞痛, 伴呕吐 4 小时。患者今晚外出聚餐后约 2 小时, 突然出现上腹部持续性、阵发性加剧的绞痛, 疼痛向左腰背部放射。同时伴有频繁恶心、剧烈呕吐, 呕吐为胃内容物。体查: 患者急性病容, 表情痛苦, 弯腰抱膝位。在交谈中表示对所患疾病一无所知, 并对自己的病情感到忧虑。T 38.5℃, P 106 次/分, R 24 次/分, BP 120/70 mmHg。上腹有压痛, 无明显腹肌紧张及反跳痛, 肠鸣音稍弱。实验室检查: WBC $12.0 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.85; 血清淀粉酶 380 U/L (参考值 30~110 U/L)。

- (1) 该患者的医疗诊断是什么?
- (2) 按优先原则提出 3 个护理诊断 (包含合作性问题, 护理诊断用 P: E 格式)。
- (3) 列出相应的护理措施。

3. 患者, 男, 40 岁, 农民。皮肤苍白, 活动无力, 反复发热 2 月余。体查: T 39.2℃, P 112 次/分, R 24 次/分, BP 92/68 mmHg; 患者清醒, 面容疲倦, 稍活动则气促加重; 皮肤粘膜苍白, 右侧颊部可见血泡 1 个, 双下肢外侧可见多个散在分布的紫癜。实验室检查: RBC $2.0 \times 10^{12}/L$, Hb 56g/L; WBC $2.5 \times 10^9/L$; Pt $22 \times 10^9/L$ 。骨髓活检示造血组织均匀性减少。

- (1) 该患者的医疗诊断是什么?
- (2) 按优先原则提出 3 个护理诊断 (含合作性问题, 护理诊断用 P: E 格式)。
- (3) 列出相应的具体护理措施。

4. 某男, 45 岁, 左腰部隐痛 1 月多。体查: 肾区有叩击痛; 尿常规检查可见镜下血尿, B 超: 左肾内有一结石, 大小为 1.2 cm×1.4 cm, IVP 示肾功能正常, 双侧输尿管通畅。诊断为“左肾结石”。问:

- (1) 目前最适宜的治疗是? 相应的护理措施?
- (2) 如何预防泌尿系结石的发生?

5. 某男, 68 岁, 不慎跌倒在地, 右侧髋部疼痛, 站立和走路时疼痛更为明显; 检查右侧肢体外旋、内收畸形, 髋部有压痛, 大转子上移; 右下肢比左下肢缩短 2 cm。

- (1) 该患者可能发生了何种损伤?
- (2) 该患者需行骨牵引, 如何护理?

