

青岛大学 2012 年 352 口腔综合考研模拟试题

文硕教育

一. 选择题 (每题 1 分, 共 100 分)

1. 下述哪项不属于牙的功能
A. 发音时限定了舌的活动范围
B. 通过咀嚼可刺激颌骨正常发育
C. 通过咀嚼增进牙周组织健康
D. 保持口腔的自洁作用
2. 下颌侧切牙与下颌中切牙比较
A. 下颌侧切牙近中缘与远中缘对称
B. 下颌侧切牙牙冠稍宽
C. 下颌侧切牙近. 远中接触区靠近切角
D. 下颌侧切牙近中切角与远中切角约相等
3. 上颌第一前磨牙 he 面窝内的点隙有
A. 中央点隙
B. 中央点隙. 近中点隙与远中点隙
C. 近中点隙与远中点隙
D. 中央点隙与近中点隙
4. 解剖学 he 平面的是指
A. 连接下颌中切牙近中邻接点与下颌两侧最后一个磨牙远中颊尖构成的平面
B. 连接下颌中切牙近中邻接点与下颌两侧第一磨牙远中颊尖构成的平面
C. 连接下颌中切牙近中邻接点与下颌两侧第一磨牙近中颊尖构成的平面
D. 连接上颌中切牙近中邻接点与上颌两侧第一磨牙远中颊尖构成的平面
5. 提颌肌收缩增强时, 咬合接触点的变化是
A. 减少 B. 增加 C. 不变 D. 没有规律
6. 下列关于髁突描述错误的是
A. 关节面从后面观可分为前斜面和后斜面
B. 分头. 颈两部
C. 头呈椭圆形
D. 头内外径长, 前后径短
7. 某患者出现左侧鼻唇沟平坦, 口角下垂, 鼓腮漏气, 但两侧额纹对称。其原因可能为
A. 左面神经颞支. 颊支. 下颌缘支受累
B. 左面神经颞支. 颧支. 颊支受累
C. 左侧上颌神经. 面神经颞支. 下颌缘支受累
D. 右侧面神经核上瘫
8. 上唇及鼻根部炎症, 若处理不当可使菌血栓逆流入颅面导致海绵窦化脓性血栓性静脉炎, 下列其可能的逆流途径中哪个是错的?
A. 面前 V-面深 V-翼丛-卵圆孔网-海绵窦
B. 面前 V-面深 V-翼丛-眼下 V-眼上 V-海绵窦
C. 面前 V-面深 V-翼丛-破裂孔导血管-海绵窦
D. 面前 V-面深 V-翼丛-领内 V-脑膜中 V-海绵窦
9. cervicalridge 是
A. 切嵴 B. 轴嵴 C. 颈嵴 D. 横嵴
10. 正中合时, 可表现为
A. 中性合 B. 近中合 C. 远中合 D. 都对
11. 全冠试戴时检查邻面接触是否紧密的方法是

- A. 牙线 B. 探针 C. 咬合纸 D. 结扎钢丝
12. 口腔颌面部视诊内容不包括
A. 面部皮肤颜色、营养状态、有无色素斑块
B. 颌面部外形对称性
C. 颌面各部分之间比例关系是否协调，有无颌面部畸形
D. 口唇的外形，笑线的高低，上下前牙位置与口唇的关系
13. 与银汞合金充填比较铸造嵌体的优点是
A. 机械性能优良 B. 固位好 C. 界面线(边缘线)短 D. 牙体切割少
- 14 可摘局部义齿固位体应具备的条件哪项是错误的
A. 必须提供足够的固位力 B. 不引起矫治性移位 C. 对口内组织不造成损伤 D. 为达到固位目的允许暴露金属
- 15 口腔环境中不利于有效稳定粘接的因素有
A. 咀嚼过程的扭力 B. 咀嚼过程的压力 C. 咀嚼过程的张力 D. 以上均正确
16. 与制定修复治疗计划有关的系统病史内容是
A. 以下均是有关的内容 B. 患者在以往治疗中是否需抗生素预防感染
C. 患者在以往治疗中是否需使用类固醇或抗凝剂 D. 有无药物过敏或牙用材料过敏史
17. 垂直距离恢复过小的表现不包括
A. 面部下 1/3 的距离减小，唇红部显窄，口角下垂
B. 鼻唇沟变浅，颏部前突
C. 息止合间隙偏大，咀嚼时用力较大
D. 在说话和进食时可出现后牙相撞声
18. 3/4 冠邻沟预备的目的是
A. 增加 3/4 冠的厚度 B. 增加 3/4 冠的强度
C. 防止 3/4 冠舌向脱位 D. 保证与邻牙接触紧密
19. 后牙选择时，下列哪一项是错误的
A. 面的沟窝较深 B. 颊舌径要适当缩小
C. 牙尖斜度最好约 30° D. 颜色与前牙一致
20. 哪种固定桥一端基牙所受合力是另一端的两倍多
A. 单侧固定桥 B. 半固定桥 C. 双端固定桥 D. 弹簧固定桥
21. 用合托测定合位关系时，如果产生合接触不良是因为
A. 蜡基托过短 B. 蜡基托无吸附力 C. 蜡堤过高 D. 蜡基托接触不均匀
- 22 可摘局部义齿间接固位体的作用不包括
A. 起主要固位作用 B. 防止义齿翘动 C. 防止义齿摆动 D. 防止义齿旋转
23. 临幊上较少选用冠内固位体的原因
A. 对牙体组织切割较深 B. 外形线较长，是防龋的薄弱环节
C. 固位体组织面离牙髓较近，容易使牙髓遭受物理和化学刺激
D. 以上均是原因
24. 由于上下牙槽骨的吸收方向不同并持续进行，其结果
A. 上颌向前下颌向后 B. 下颌向上上颌向后
C. 上颌弓大于下颌弓 D. 下颌弓大于上颌弓
25. 回力卡环特点为
A. 固位臂尖端位于基牙颊面倒凹区，带远中合支托，无近中合支托
B. 固位臂尖端位于基牙舌面倒凹区，带远中合支托，无近中合支托
C. 固位臂尖端位于基牙近中邻面倒凹区，带远中合支托
D. 固位臂尖端位于基牙颊面倒凹区，带近中远中合支托
- 26 制作固定桥金属桥架，下列哪项要求是错误的
A. 前牙咬合接触最好在瓷面上 B. 连接体四周外形应圆钝，面积不应小于 4mm²
C. 桥架表面应留有 1~1.5mm 的空隙 D. 桥架龈端与牙槽嵴黏膜之间应有 1mm 的空隙
- 27 咀嚼肌检查通常先检查

- A. 咬肌和翼外肌 B. 咬肌和翼内肌 C. 翼外肌和颞肌 D. 咬肌和颞肌
- 28 不属于烤瓷熔附金属全冠适应证的是
A. 青少年恒牙出现氟斑牙、变色牙、四环素染色牙、釉质发育不全时
B. 龋洞或牙体缺损大不能采用充填治疗时
C. 前牙错位、扭转不能或不宜做正畸治疗者
D. 需做烤瓷桥固位体的基牙
29. 确定垂直距离的目的是
A. 确定正中关系位 B. 确定正中合位 C. 确定颌间距离 D. 确定合平面
- 30 牙列缺失后附丽在颌骨周围的软组织位置关系改变是因为
A. 牙槽骨不断吸收 B. 软组织萎缩 C. 颌关系改变 D. 手术后软组织被推移
- 31 影响环抱固位形固位力的重要因素不包括
A. 合龈高度 B. 轴壁的平行度 C. 轴壁的聚合度 D. 黏结剂的厚度
- 32 为使固定桥充分发挥咀嚼功能，首要的是
A. 恢复良好的桥体 B. 丰满的缺牙区牙槽嵴
C. 活髓基牙 D. 良好的固位、稳定
- 33 上颌义齿后堤区(密封带)应在
A. 前颤动线之前 B. 腭小凹之前 C. 腭小凹翼上颌切迹线上 D. 前后颤动线之间
- 34 下列哪项不是间接固位体的功能
A. 减少游离端义齿的合向脱位 B. 对抗侧向力，起平衡作用
C. 防止义齿摆动 D. 增加义齿的整体美观
35. 下列哪项不能作为人造冠就位的参考标志
A. 龈边缘到达设计位置 B. 咬合基本良好 C. 就位后不出现翘动感 D. 冠边缘密合
- 36 牙体缺损修复时，修复体正确恢复牙体形态应包
A. 轴面形态 B. 邻接关系 C. 外展隙和邻间隙 D. 以上都需要恢复
- 37 一般情况下 kennedy 三类义齿功能好的主要原因是
A. 失牙少 B. 义齿双侧设计 C. 后牙的两侧都有基牙 D. 为牙支持式义齿
- 38 按照无牙颌组织结构特点和全口义齿的关系，下颌舌骨嵴属于哪一区
A. 主承托区 B. 副承托区 C. 边缘封闭区 D. 缓冲区
- 39 修复体修复与充填修复牙体预备的区别点是
A. 去除病变组织，阻止病变发展 B. 磨改过长牙、错位牙、异常对颌牙及邻牙，并做预防性扩展 C. 磨除薄弱的尖嵴和无牙本质支持的牙釉质 D. 预备良好的固位形和抗力形
- 40 全口义齿侧方合时工作侧牙尖工作斜面指
A. 上下牙颊斜面 B. 上下牙舌斜面 C. 上牙颊斜面、下牙舌斜面 D. 上牙舌斜面、下牙颊斜面
- 41 固定桥黏固后引起牙龈炎的原因不包括
A. 黏固剂未去尽 B. 固位体与基牙不密 C. 菌斑附着 D. 牙龈组织受压
42. 接触区颊舌径大于合龈径的牙是
A. 前牙接触区 B. 尖牙与双尖牙接触区 C. 双尖牙接触区 D. 磣牙接触区
- 43 全口义齿基托在下颌磨牙后垫区应位于
A. 全部覆盖磨牙后垫 B. 覆盖磨牙后垫 2/3 以上 C. 止于磨牙后垫前缘 D. 覆盖磨牙后垫 1/2
- 44 哪项不是可摘局部义齿基托的主要功能
A. 连接义齿各部件成一整体 B. 承担、传递和分散力
C. 直接强有力的固位作用 D. 修复缺损的软硬组织
45. 下列对智齿冠周炎的描述，错误的是
A. 智齿冠周炎主要发生在萌出不全的患者
B. 上颌第三磨牙冠周炎发病率较低
C. 临幊上以远中水平阻生智齿冠周炎为好发
D. 是指发生在智齿牙冠周围的软组织炎症
46. 关于脓肿切开的目的，下列哪个说法是不正确的

- A. 预防感染向颅内扩散
B. 预防并发边缘性骨髓炎
C. 排出脓液达到消炎解毒的目的
D. 有利于细菌培养确定病原菌
47. 旋转力除可用于上前牙拔除外，还可用于哪个牙齿
A. 下颌双尖牙
B. 上颌双尖牙
C. 下颌智齿
D. 下颌中切牙
48. 口腔颌面部感染的主要途径是
A. 腺源性
B. 损伤性
C. 血源性
D. 牙源性
49. 单纯高血压无其他合并症时，血压高于多少应先治疗后再拔牙
A. 160 / 95mmHg
B. 190 / 100mmHg
C. 180 / 100mmHg
D. 190 / 105mmHg
50. 牵张速度是指每日牵开的骨断端之间的距离，公认的较理想的速度是
A. 1mm/d
B. 2 mm/d
C. 3 mm/d
D. 5 mm/d
51. 腮腺手术后出现眼睑闭合不全，因为损伤了
A. 面神经颞支
B. 眼上神经
C. 面神经颧支
D. 动眼神经
52. 最常见的颌骨骨髓炎为
A. 化脓性
B. 特异性
C. 物理性
D. 化学性
53. 牙源性的良性肿瘤中最常见的是
A. 成釉细胞瘤
B. 牙源性黏液瘤
C. 牙骨质瘤
D. 牙瘤
54. 牙拔除过程中最常见的软组织损伤部位为
A. 唇
B. 牙龈
C. 腭
D. 颊
55. 种植手术用骨钻钻孔，钻速不能超过
A. 1000r/min
B. 1500 r/min
C. 2000 r/min
D. 2500 r/min
56. 目前最常用的制作种植体的材料为

- A. 不锈钢
- B. 镍铬合金
- C. 钛
- D. 金

57. 智齿冠周炎最易发生的年龄组为

- A. 18岁以下
- B. 50岁以上
- C. 30~40岁
- D. 18~30岁

58. 关于下颌双尖牙，哪项描述是错误的

- A. 根周颊侧骨板较薄
- B. 不宜使用旋转力
- C. 拔牙时应向颊牙合面牵引脱位
- D. 拔除时摇动力和旋转力配合使用

59. 关于刮匙的用途，下列哪项是错误的

- A. 搔刮根尖瘘管
- B. 搔刮根尖脓肿
- C. 探查牙槽窝
- D. 刮除根尖肉芽肿

60. 上颌结节阻滞麻醉容易发生的并发症是：

- A. 注射针尖折断
- B. 病人恶心
- C. 血肿
- D. 注射区疼痛和水肿

61. 安放拔牙钳方法正确的是

- A. 使用牙钳只能向颊舌侧的摇动，以免断根
- B. 喙尖应在牙釉质上
- C. 喙尖应在牙颈下方的牙骨质处
- D. 夹持不要太紧，以免冠碎

62. 多形性腺为

- A. 良性肿瘤，生长较快
- B. 良性肿瘤，生长缓慢
- C. 恶性肿瘤，易复发
- D. 恶性肿瘤，生长较快

63. 智齿冠周炎的治疗原则中，不包括

- A. 消炎
- B. 增强全身抵抗力
- C. 拔除智齿
- D. 切开引流

64. 关于医源性感染，下列正确的说法是

- A. 在医院内发生的传染病
- B. 医生得的传染病
- C. 医务人员进行有创的操作后造成的继发感染
- D. 由于医务人员用药不当造成的二重感染

65. 以下乳牙萌出先后的顺序哪个是正确的

- A. I II V III IV
- B. I II III IV V
- C. I II IV III V
- D. V I II III IV

66. 某患者因腮腺良性肿瘤将于明日行腮腺浅叶切除术加面神经解剖术，今日术前家属

签字时，谈话中以下哪项是不必要的

- A. 术后可能出现面瘫
 - B. 可能出现半侧下颌骨麻木
 - C. 涎瘘
 - D. Frey 综合征
67. 窝洞外形线需制备成圆缓曲线，其目的是为了
- A. 防止充填体脱落
 - B. 防止充填体折断
 - C. 防止牙体折裂
 - D. 达到良好的美观效果
68. 关于盖髓术适应证的叙述，有哪一项是错误的
- A. 深龋引起的可复性牙髓炎
 - B. 龋齿备洞时意外穿髓
 - C. 深龋去腐未净露髓
 - D. 年轻人恒牙的急性急慢性牙髓炎
69. 急性根尖周炎应急处理的主要原则是
- A. 消炎止痛
 - B. 安抚治疗
 - C. 调（牙合）止痛
 - D. 建立引流
70. 有关活髓切断术的叙述，哪一项是不必要的
- A. 术前口服抗生素
 - B. 局部麻醉，橡皮障隔湿
 - C. 去净腐质，消毒窝洞
 - D. 去净髓室顶，切除冠髓
71. 以下哪种情况不会影响面部外形的对称性
- A. 偏侧咀嚼
 - B. 单个牙牙体缺损
 - C. 牙列缺失
 - D. 后牙早失
72. 下列对磨耗的生理意义的描述中错误的是
- A. 减少临床冠长度，保持冠根比例协调
 - B. 形成尖牙保护胎
 - C. 降低牙尖高度，减少侧向力
 - D. 为第三磨牙提供空间
73. 哪种疾病不属于牙髓炎
- A. 致密性骨炎
 - B. 残髓炎
 - C. 牙内吸收
 - D. 髓石
74. 根尖诱导成形术在诱导根尖形成的组织机制不包括
- A. 根尖部残留活髓
 - B. 根尖部牙乳头
 - C. 上皮根鞘
 - D. 牙槽骨
75. 深龋和慢性牙髓炎的主要鉴别要点是
- A. 刺激痛的强弱
 - B. 有无自发痛史
 - C. 自发痛的剧烈程度
 - D. 自发痛能否定位

76. 多发 C 型根管的牙位是

- A. 下颌第一磨牙
- B. 下颌第二磨牙
- C. 上颌第一磨牙
- D. 上颌第二磨牙

77. 备洞时下列那一项能增加对牙髓的刺激

- A. 间断磨除
- B. 连续磨除
- C. 冷却水降温
- D. 选用锐利的车针

78. 男性，55岁。左下后牙进食时酸痛明显1个月余，无自发痛。口腔检查：左下6合面龋洞，叩诊（-），探诊（+），无松动。温度刺激试验（+），刺激去除后症状即刻消失。
X线片示：龋洞底离髓腔较远。左下6可诊断为

- A. 浅龋
- B. 中龋
- C. 深龋
- D. 线性釉质龋

79. 牙体缺损最常见的原因是

- A. 楔状缺损
- B. 龋病
- C. 牙外伤
- D. 磨损

80. 女性，10岁，舌背反复出现红色斑片半年，病损形态时常变换，一般无疼痛。检查：舌背及舌缘有一红色区域，丝状乳头萎缩，周边为黄白色的围线，界限分明。疾病的诊断可能是以下名称，除了

- A. 地图舌
- B. 地图样舌炎
- C. 剥脱性舌炎
- D. 游走性舌炎

81. 哪种疾病不属于癌前病变

- A. 扁平苔藓
- B. 口腔白斑病
- C. 口腔红斑病
- D. 血管神经性水肿

82. 靶型红斑好发于哪种黏膜病

- A. 蕈疹性口炎
- B. 多形性红斑
- C. 寻常型天疱疮
- D. 扁平苔藓

83. 腺周口疮的临床表现下列哪项是错误

- A. 损害常为多个大溃疡，罕见单发
- B. 溃疡直径为1~3cm或更大
- C. 常累及深层粘膜腺组织
- D. 溃疡周围组织红肿或微显隆起

84. 妊娠期龈炎的优势菌是

- A. 溶血性链球菌
- B. 中间普氏菌
- C. 变性链球菌
- D. 螺旋体

85. 蕈疹性口炎的病因是

- A. 病毒
B. 细菌
C. 真菌
D. 衣原体
86. 被称为“口-眼-生殖器三联征”的疾病是
A. 疱疹性口炎
B. 赖特尔综合征
C. 白塞病
D. 疱疹性口疮
87. 口外上颌前方牵引矫治器的目的是
A. 利用口外力促进生长发育期的上颌骨发育
B. 促进成人上颌骨发育
C. 限制成人上颌骨发育
D. 限制生长发育期上颌骨发育
- 88 功能性矫治器的主要使用对象
A. 混合牙列期
B. 乳牙期
C. 成人期
D. 恒牙期
89. 纠正前牙反牙合常用的活动矫治器是
A. 上颌双侧牙合垫矫治器
B. 单侧牙合垫矫治器
C. 标准的 Hawley 保持器
D. 平面导板矫治器
90. 下列哪项不是活动矫治器的组成部分
A. 箭头卡环
B. 邻间钩
C. 双曲唇弓
D. 带环
91. 矫治器不能引起何处发生变化
A. 颌骨
B. 牙周支持组织
C. 错位牙齿
D. 枕骨
92. 矫治前必须有记录患者牙牙合情况的模型，称之为
A. 记存模型
B. 石膏模型
C. 上颌模型
D. 初模型
93. 上下前牙切端的前后距离超过 3mm 以上者，称为深覆盖，分为三度，III 度深覆盖
为
A. 3~5mm
B. 5~8mm
C. 8mm
D. 1~mm
94. 在错牙合畸形的检查诊断中，下列哪项不符合
A. 无需询问有无全身性疾病及鼻咽部疾病
B. 对牙弓检查时要进行牙拥挤度测定
C. 要检查上下中切牙间的中线关系
D. 询问幼年时有无口腔不良习惯

95. 上前牙冠覆盖下前牙冠超过 1/3 者称为深覆牙合，其分为三度，I 度深覆牙合为
 A. 覆盖为 3~5mm
 B. 上前牙冠覆盖下前牙超过冠 1/3 而不足 1/2 者
 C. 上前牙冠覆盖下前牙超过冠 1/2 而不足 2/3 者
 D. 上前牙冠覆盖下前牙超过冠 2/3 者
96. 牙齿拥挤度一般分为三度，II 度拥挤是指牙冠宽度的总和与牙弓现有弧形的长度之差是
 A. 2~4mm
 B. 4~8mm
 C. 8mm 以上
 D. 16mm 以上
97. 上下牙弓狭窄其矫治原则为
 A. 缩小上牙弓宽度，或扩大下牙弓宽度，或二者并用
 B. 升高前牙或压低后牙
 C. 扩大上牙弓。或用肌能训练矫治法，并加强营养及咀嚼功能，以促进颌骨及牙弓的发育
 D. 矫正领间关系
98. 面部肌肉建牙合的动力平衡中，与向后的动力有关的肌肉是
 A. 颞肌
 B. 翼内肌
 C. 咬肌
 D. 上下唇方肌
99. 下列哪项是错牙合畸形的病因
 A. 牙列缺失
 B. 遗传因素
 C. 楔状缺损
 D. 四环素牙
100. 开口型指的是：
 A. 张口的大小
 B. 上下唇之间距离的运动轨迹
 C. 上下切牙切缘间的距离
 D. 下颌下降运动时颏点

二、填空题（本题共 30 分）

1. 牙龈固有层中的胶原纤维束可分为：_____
2. 牙髓变性可表现为_____等情况。
3. 非炎症性的牙龈增生是_____。
4. 唾液腺中具有内分泌功能的导管_____，其分泌的_____可以促进骨和牙本质的形成和矿化。
5. 要衬托出上唇丰满度下前牙切缘在唇下应露出_____。
6. 肯氏第一类牙列缺损为_____。
7. 选择人工前牙时遵循的原则是_____。
8. 具有三型观测线的基牙_____。
9. 缺牙间隙龈距离短，对 为天然牙时，人工牙最好选_____。
10. 口腔白斑可分为均质型和非均质型两大类，前者如_____；而_____等属于后者。
11. 通过病人的_____，检查关节的功能是否正常。
12. 腮腺和下颌下腺的扪诊应该包括_____。腮腺扪诊一般以_____为宜。下颌下腺和舌下腺的扪诊常采用_____。
13. 恶性肿瘤的临床病理表现类型有_____。

三. 名词解释（本题共 48 分，每题 8 分）

1. 龈牙结合部:
2. 覆盖义齿
3. Ramsay-Hunt 综合征:
4. 继发龋 (secondary caries)
5. 局部麻醉 (local anesthesia)
6. 舍格伦综合征 (Sjogren syndrome)

四. 简答题（本题共 72 分，每题 12 分）

1. 在乳牙恒牙交替过程中，恒前牙一般比相应的乳前牙大，其相差的量，可由哪几方面来补偿？

2. G. V. Black 分类都分哪几类？

IV 类洞：为前牙邻面累及切角的龋损所备成的洞

V 类洞：所有牙的颊（唇）舌面颈 1/3 处的龋损所备成的窝洞。

3. 颞下颌关节病的临床表现为？

4. 沃辛瘤的临床特点为？

5. 牙龈退缩的原因

6. 面神经主干在腮腺内的分支

五. 问答题（本题共 50 分）

1. 替牙期间的暂时性错合，哪些情况不需矫治？

2. 试述上颌骨骨折的三型，及其临床表现

3. 牙尖交错牙合的咬合接触特征