

苏 州 大 学

二〇〇九年攻读硕士学位研究生入学考试试题

专业名称：护理学

考试科目：护理综合(A卷)

一. 单选题（占 60%，180 分，每题 1.5 分，120 道题）

1. 科学的护理专业由谁首创?
A. 南丁格尔 B. 韩德森 C. 约翰森 D. 克瑞特
2. 下列护理诊断描述不正确的是
A. 清理呼吸道无效，与肺部感染有关 B. 疼痛，与腹痛有关
C. 有皮肤完整性受损的危险，与长期卧床不翻身有关
D. 活动无耐力，与心输出量减少有关
3. 某一“心衰”病人入院时表现出呼吸困难、紫绀、不能平卧，双下肢水肿，食欲差。既往有“便秘”史。其首优问题是
A. 便秘 B. 气体交换受损
C. 营养失调，低于机体需要量 D. 有皮肤完整性受损的危险
4. 从病因上防止健康问题的发生，主要采取自我保健方法及特殊保护措施，防止疾病的发生，这种预防称为：
A. 临床前期预防 B. 三级预防 C. 二级预防 D. 一级预防
5. “原始人打制石器”的文化现象，属于文化的哪个特征？
A. 超自然性 B. 超地域性 C. 超个人性 D. 超时代性
6. 护理质量评价中以护士运用护理程序的规范行为为标准，该评价属于
A. 结构评价 B. 过程评价 C. 结果评价 D. 护理评价
7. 护理人员所面临的诸多人际关系中，最重要的关系是
A. 护患关系 B. 医患关系 C. 护际关系 D. 护技关系
8. 1919 年在哪个国家颁布了第一部国际护理法
A. 中国 B. 英国 C. 美国 D. 加拿大
9. 在压力源的刺激下，机体出现一系列以交感神经兴奋为主的改变，这属于压力反应的哪个阶段
A. 警告期 B. 抵抗期 C. 衰竭期 D. 反应期

10. 健康相关行为是指：
A. 危害健康行为 B. 心理保健行为
C. 促进健康行为和危害健康行为 D. 定期体格检查
11. 护理理念的基本要素是：
A. 个人、家庭、社区、社会 B. 人、健康、疾病、护理
C. 健康、疾病、环境、护理 D. 人、健康、环境、护理
12. 依据纽曼模式，第三级预防保健护理的重点是：
A. 早期发现病例 B. 早期治疗
C. 控制或改变压力源
D. 帮助护理对象恢复和重建功能，防止压力源的进一步损害
13. 属于主观方面的健康资料是：
A. 体温 39 度 B. 胸闷气短 C. 呼吸急促 D. 口唇发绀
14. 一大面积灼伤病人入院，应给予
A. 特别护理 B. 一级护理 C. 二级护理 D. 三级护理
15. 一女性患者高热 4 天，伴神志不清，反复抽搐，经多方检查考虑乙型脑炎，应立即行：
A. 接触隔离 B. 昆虫隔离 C. 消化道隔离 D. 呼吸道隔离
16. 肢体能抬离床面，但不能对抗阻力的肌力程度是：
A. 1 级 B. 2 级 C. 3 级 D. 4 级
17. 低胆固醇饮食是指每日胆固醇的摄入量少于
A. 100mg/d B. 200mg/d C. 300mg/d D. 400mg/d
18. 下列哪项不是评价疼痛护理效果的依据
A. 能否参加日常活动 B. 睡眠质量提高
C. 疼痛征象减轻 D. 愿意独自居住
19. 不需作出入液量记录的病人是
A. 胃大部切除术后 B. 肝硬化腹水 C. 大面积烧伤 D. 休克
20. 下列病人中，哪两位是可以安排在同一病室中治疗的
A. 流脑与菌痢者 B. 菌痢与伤寒者
C. 伤寒与肺结核者 D. 麻疹与乙型脑炎儿童

21. 取无菌溶液时，不需检查的是
A. 药液制品的厂名及批号 B. 瓶子有无裂缝
C. 瓶盖有无松动 D. 溶液有无沉淀、浑浊、变色
22. 留取 24h 尿标本的正确方法是
A. 弃去第 1 次和最后 1 次尿 B. 留取第 1 次和最后 1 次尿
C. 弃去第 1 次尿，留取最后 1 次尿 D. 留取第 1 次尿弃去最后 1 次尿
23. 呼吸和呼吸暂停现象交替出现，称为
A. 陈-施呼吸 B. 毕奥氏呼吸 C. 鼾声呼吸 D. 浅表呼吸
24. 间歇脉常由于下列哪项因素造成？
A. 心房纤颤 B. 期前收缩 C. 心室纤颤 D. 心动过缓
25. 患者丁某，入院 7 天，体温平均在 39.5~40℃ 左右，24h 波动不超 1℃，其热型是：
A. 间歇热 B. 骤张热 C. 波浪热 D. 稽留热
26. 留置气泡技术，用于
A. 皮内注射 B. 皮下注射 C. 肌内注射 D. 静脉注射
27. 有机磷农药中毒患者的瞳孔直径常常？
A. <2 mm B. 2-5mm C. >2mm D. >5mm
28. 排便时粪便刺激直肠壁内感受器，其兴奋冲动经_____传至腰骶段初级排便中枢。
A. 盆神经和骶神经 B. 腹下神经及骶神经
C. 盆神经及腹下神经 D. 会阴神经及骶神经
29. 当氧疗浓度高于 60%，持续时间超过 24h，可能出现的氧疗副作用是
A. 吸气性呼吸困难 B. 氧中毒
C. 深度呼吸 D. 诱发哮喘
30. 下述注射进针角度不正确的是
A. (ID) 5° B. (IH) 15° C. (IM) 90° D. (IV) 20°
31. 输液时，病员诉胸部不适，随即发生呼吸困难、严重紫绀，心前区听诊闻及响亮的持续的“水泡声”，该患者可能发生了：
A. 发热反应 B. 空气栓塞 C. 过敏反应 D. 急性肺水肿

32. 测量血压时，缓慢放气的速度应控制在
A. 下降 2 mmHg/s B. 下降 4 mmHg/s C. 下降 6 mmHg/s D. 下降 8 mmHg/s
33. 施行基础生命支持技术前评估下列哪二项指征最为重要
A. 面色死灰，意识丧失 B. 呼吸停止，瞳孔散大
C. 大动脉搏动消失，面色死灰 D. 意识突然丧失，大动脉搏动消失
34. 王某，女性，50岁，因发热待查而收住入院。入院测得的体温为摄氏 38.9℃，转换成华氏温度为
A. 98°F B. 100°F C. 102°F D. 104°F
35. 磷化锌灭鼠药中毒时，禁忌使用的洗胃剂是
A. 高锰酸钾 B. 碳酸氢钠 C. 油类 D. 硫酸镁
36. 病人在日常活动时既需要别人的帮助，也需要设备和仪器的辅助，其活动功能为：
A. 1' B. 2' C. 3' D. 4'
37. 下列那项提示左心室功能不全：
A. 交替脉 B. 奇脉 C. 水冲脉 D. 短绌脉
38. 金女士，40岁。患尿毒症2年，近3日连续晨起后恶心、呕吐。对症护理措施正确的一项是：
A. 睡前勿进食、勿饮水 B. 晚间睡前饮水1—2次
C. 睡前吃少量点心 D. 起床后先服止吐药
39. 下列那种疾病不会导致栓塞：
A. 房颤 B. 左房黏液瘤 C. 心内膜炎 D. 高血压
40. 继发性高血压最常见的原因为：
A. 肾上腺皮质疾病 B. 血管疾病 C. 肾上腺髓质疾病 D. 肾脏疾病
41. 高血压合并糖尿病，降压药首选：
A. 倍他受体阻滞剂 B. ACEI C. 钙离子拮抗剂 D. 利尿剂
42. 急性心肌梗死合并心室颤动，治疗首选：
A. 非同步直流电复律 B. 利多卡因 C. 同步直流电复律 D. 异搏定
43. 放射性¹³¹I治疗甲亢，最常见的并发症：
A. 甲状腺炎 B. 甲减 C. 突眼恶化 D. 肝损

44. 扩血管药物治疗心功能不全的主要作用机理是：
A. 增强心肌收缩力 B. 降低心肌耗氧量
C. 降低心脏前、后负荷 D. 减慢心率
45. 急性心肌梗死最常见的心律失常是：
A. 阵发性室上性心动过速 B. 房扑
C. 病窦综合症 D. 室早或室速
46. 扩张型心肌病的特征是：
A. 以心肌肥厚为主 B. 心前区有杂音
C. 以心腔扩大为主 D. 休克
47. 急性心肌梗死并发多源性室性早搏，应首选：
A. 利多卡因 B. 洋地黄 C. 异搏定 D. 电复律
48. 茶碱类药物静脉注射时浓度不宜过高，速度不宜过快，注射时间应在分钟以上。
A. 5 B. 10 C. 15 D. 20
49. 尿毒症病人最早期的临床表现是：
A. 周围神经炎 B. 心律失常 C. 胃肠道症状 D. 水电解质失调
50. 尿路感染最常见的致病菌是：
A. 变形杆菌 B. 绿脓杆菌 C. 大肠杆菌 D. 粪链球菌
51. 肾脏是排泄器官，也是重要的内分泌器官，它所分泌的激素，下列哪项应除外：
A. 红细胞生成激素（EPO） B. 肾素 C. 前列腺素（PG） D. 醛固酮
52. Guillain—Barre 综合征最危险的并发症：
A. 呼吸肌麻痹 B. 感染 C. 瘫痪 D. 排尿困难
53. 脑栓塞最常见的病因是：
A. 亚急性细菌性心内膜炎 B. 先心病 C. 风心合并房颤 D. 动脉粥样硬化
54. 抗癫痫药物治疗癫痫的原则是：
A. 大量突击静脉用药 B. 大剂量短期合并用药
C. 按发作类型，短期用药，随时改变品种 D. 按发作类型，长期规划用药

55. 白血病患者肢体疼痛与下列_____有关:
A. 出血 B. 白血病细胞浸润骨骼 C. 感染 D. 缺钙
56. 脑梗塞患者 CT 图象为:
A. 起病后即可见异常低密度影 B. 起病 24-48h 后可见异常低密度影
C. 起病后即可见异常高密度影 D. 起病 24-48h 后可见异常高密度影
57. 关于消化性溃疡以下哪条是错误的:
A. 基本因素为胃酸及胃蛋白酶 B. Du 较 Gu 多见
C. 好发于青壮年 D. 胃窦部滞留为 Gu 的原发病理
58. 肝硬化腹水的饮食护理中哪条是错误的:
A. 应低盐或无盐饮食 B. 进水量限制在 500ml 以下
C. 含钠食物尽量少用 D. 可适量添加柠檬汁以调味
59. 关于肝硬化以下哪条是错误的:
A. 戊肝也能发展为肝硬化 B. 自身免疫性肝炎可发展为肝硬化
C. 血吸虫病可发展为肝纤维化 D. 酒精中毒国外多见
60. 关于消化性溃疡以下哪项是错误的:
A. 消化性溃疡的命名主要因其发生于消化道而来
B. HP 感染是消化性溃疡的主要病因
C. 胃液分泌过多在十二指肠溃疡中起主要作用
D. 长期服用非甾体类消炎药可诱发消化性溃疡
61. 关于结核性腹膜炎哪条是错误的:
A. 多由直接蔓延所致 B. 常有其它部位结核
C. 腹部包块常见于粘连型 D. 腹水多为淡血性
62. 以下哪条是 B 型胃炎的临床表现:
A. 多由免疫异常所致 B. 好发于胃体
C. 常有消化不良症状 D. 与 HP 感染无关
63. 关于急性胰腺炎的治疗中哪条是错误的:
A. 禁食及胃肠减压 B. 可用抗胆碱能药物
C. 生长抑素可持续用 3~7 天 D. 一般不用抗生素

44. 血管扩张药物治疗心功能不全的主要作用机理是:
- A. 增强心脏收缩力
 - B. 降低心脏耗氧量
 - C. 脉络血管前、后负荷
 - D. 减慢心率
45. 心绞痛最常见的临床特点是:
- A. 阵发性室上性心动过速
 - B. 房扑
 - C. 痛突然发生
 - D. 室早或室速
46. 扩张心脏的特征是:
- A. 以心肌肥厚为主
 - B. 心前区有疼痛
 - C. 以心脏扩大为主
 - D. 心电图
47. 急性心肌梗死并发多源性室性早搏，应首选:
- A. 利多卡因
 - B. 洋地黄
 - C. 异搏定
 - D. 电复律
48. 药物类药物注射时浓度不宜过高，速度不宜过快，在射时间应在一分针以上。
- A. 5
 - B. 10
 - C. 15
 - D. 20
49. 急性左房人最早期的临床表现是:
- A. 围围神经炎
 - B. 心律失常
 - C. 周围道症状
 - D. 水电解质失调
50. 脑膜感染最常见致病菌是:
- A. 变形杆菌
 - B. 细胞杆菌
 - C. 大肠杆菌
 - D. 黄链球菌
51. 脊髓是排泄器官，也是重要的内分泌器官，它所分泌的激素，下列哪项除外:
- A. 红细胞生成素(EPO)
 - B. 儿茶素
 - C. 前列腺素(PG)
 - D. 麻醉酮
52. Guillain-Barré综合症危脸的并发症:
- A. 听觉损害
 - B. 眼炎
 - C. 糖尿病
 - D. 肢体麻痹
53. 脑栓塞最常见的病因是:
- A. 亚急性细菌性心内膜炎
 - B. 先心病
 - C. 风心合并房颤
 - D. 动脉粥样硬化
54. 抗癫痫药物治疗癫痫的原则是:
- A. 大剂量长期合用药物
 - B. 大剂量短期合用药物
 - C. 缓发作用型，短时改用品种
 - D. 缓发作用型，长期规律用药

64. 女性，16岁，多饮、多食半年，尿糖++，空腹血糖5.6mol/L，餐后2小时血糖7.73mol/L。
诊断考虑为：
A. 1型糖尿病 B. 2型糖尿病 C. 肾性糖尿 D. 糖耐量异常
65. 下列哪项症状是甲亢的特殊临床表现：
A. 局限性胫前粘液性水肿 B. 多食善饥
C. 神经过敏 D. 月经过少
66. 1型糖尿病的特点：
A. 空腹胰岛素水平正常 B. 中老年多见
C. 病情不稳定，易发生酮症 D. 明显的遗传倾向
67. 关于糖尿病的诊断描述，以下哪一项是正确的：
A. 必需有“三多一少”症状 B. 空腹血浆胰岛素水平降低
C. 单次空腹血糖正常不能排除糖尿病 D. HbA_{1c}升高可诊断糖尿病
68. 下列哪项指标不符合渗出液
A. 胸水蛋白>30g/L B. 胸水蛋白/血清蛋白>0.5
C. 胸水LDH>200IU/L D. 胸水LDH/血清LDH<0.6
69. 肺心病降低肺动脉高压的首选治疗是：
A. 氧疗 B. 血管扩张剂 C. 利尿剂 D. 强心剂
70. 关于慢性支气管炎的病因，不正确的是：
A. 吸烟 B. 感染 C. 精神因素 D. 气候
71. 男性，65岁，寒战、高热、咳嗽、胸痛，痰呈砖红色胶冻状，原有糖尿病史，胸片示右上肺叶多发性蜂窝状肺脓肿，叶间隙下坠，血常规，白细胞 $11 \times 10^9/L$ ，N：85%，L：15%，最可能的诊断是：
A. 肺炎球菌性肺炎 B. 金葡菌性肺炎 C. 军团菌肺炎 D. 克雷白杆菌肺炎
72. 哮喘急性发作时应鼓励病人每天饮水_____ml：
A. 1000-1500 B. 1500-2000 C. 2000-2500 D. 2500-3000
73. 男性，58岁，咳嗽，咳痰伴喘息3年，每年秋冬季发作3个月，近5天感冒后，咳喘加重伴发热，肺可闻及干湿性罗音，最可能的诊断是：
A. 慢性单纯型支气管炎（急性发作期） B. 慢性单纯型支气管炎（慢性迁延期）
C. 慢性喘息型支气管炎（急性发作期） D. 慢性喘息型支气管炎（慢性迁延期）

74. 关于铁的吸收，下列哪项是错误的：
A. 低铁比高铁易吸收 B. 与维生素 C 同服
C. 主要在回肠末端吸收 D. 主要在十二指肠吸收
75. 自身免疫性溶血性贫血需输血时，最好选择：
A. 全血 B. 血浆 C. 洗涤红细胞 D. 浓缩血小板
76. 肺炎合并感染性休克在补充血容量时，以中心静脉压不超过 CmH₂O，尿量在 ml/h 以上为宜：
A. 5, 20 B. 10, 20 C. 5, 30 D. 10, 30
77. 心源性水肿其特点是早期出现在：
A. 下肢 B. 尾骶部 C. 足踝部 D. 身体低垂的部分
78. 白血病病人实施隔离措施属于 隔离。
A. 严密隔离 B. 接触隔离 C. 保护性隔离 D. 消化道隔离
79. 慢性心功能不全病人，长期服用噻嗪类利尿剂，最主要的副作用是：
A. 低钠血症 B. 低钾血症 C. 低氯血症 D. 脱水症
80. 安装起搏器的病人，如出现脉搏过慢应及时就诊，过慢即为低于起搏频率：
A. 4 次/分以上 B. 5 次/分以上 C. 6 次/分以上 D. 10 次/分以上
81. 血液病患者在出血的情况下，如必须注射或穿刺时下列哪种是正确的：
A. 注射或穿刺时应快速 B. 注射或穿刺时应准确
C. 按压时间宜长 D. 以上全是
82. DIC 损伤后的出血，主要与下列哪些原因有关：
A. 血小板减少 B. 血管壁通透性增加 C. 凝血因子被消耗 D. 全血细胞下降
83. 哪类贫血患者易出现口腔炎、舌炎及“牛肉舌”：
A. 缺铁性贫血 B. 巨幼红细胞贫血 C. 再障 D. 溶血性贫血
84. 治疗再障使用丙酸睾丸酮等油剂药物时，应注意：
A. 深部肌注 B. 缓慢分层肌注 C. 轮换注射部位 D. 以上均是
85. 水电解质、酸碱失衡的病人呼吸深而快且呼出气体有酮味，可能为
A. 代谢性酸中毒 B. 肺水肿 C. 低镁血症 D. 代谢性碱中毒

86. 烧伤病评估休克是否得到纠正，最重要指标是监测
A. 血压 B. 脉搏 C. 呼吸 D. 每小时尿量
87. 低血钾可引起
A. 酸中毒 B. 碱中毒 C. 高渗性脱水 D. 低渗性脱水
88. 休克的实质为
A. 收缩压下降 B. 脉压下降 C. CVP 下降
D. 组织血流量下降及细胞缺氧
89. 补液试验：取等渗盐水 250ml，于 5-10 分钟内经静脉滴入，如血压升高而中心静脉压不变则提示
A. 血容量不足 B. 心功能不全
C. 血容量严重不足 D. 血容量相对过多
90. 对抽搐频繁、药物不易控制的严重破伤风病人，有效改善通气的重要措施是
A. 吸氧 B. 气管插管 C. 尽早气管切开 D. 注射呼吸兴奋剂
91. 手术皮肤准备超过多长时间应重新准备。
A. 6 小时 B. 12 小时 C. 18 小时 D. 24 小时
92. 术后切口感染表现，下列哪项有错
A. 术后 24 小时内高热 B. 切口红肿热痛
C. 术后 3 日切口疼痛加剧 D. 术后 3 日体温仍在 38 度以上
93. 不符合手术器械台管理要求的是
A. 台面干燥、整洁 B. 器械不用后再拭擦
C. 物品分类放置 D. 严格遵守无菌技术
94. 拔除胃管指征哪项错误
A. 胃肠引流液量减少 B. 病人有饥饿感
C. 腹胀减轻 D. 肠蠕动恢复
95. 急性胰腺炎术后为了维持有效呼吸型态，下列哪项是错误的
A. 观察呼吸型态 B. 半卧位 C. 吸氧 D. 给予解痉剂

96. 甲状腺大部切除术后立即发生声音嘶哑，提示
A. 甲状腺危象先兆 B. 喉返神经损伤
C. 喉头水肿 D. 喉上神经损伤
97. 甲状腺手术后最危急的并发症是
A. 甲状腺危象 B. 声音嘶哑 C. 手足抽搐 D. 呼吸道梗阻
98. 开放性腹部损伤，下列措施哪项不妥
A. 肠管脱出及时回纳 B. 妥善处理伤口
C. 及时止血 D. 包扎固定
99. 门静脉高压症病人急性出血，放置三腔管的时间不宜超过
A. 5天 B. 4天 C. 3天 D. 2天
100. 颈椎前路手术最危险的并发症是
A. 呼吸困难 B. 出血 C. 感染 D. 血管和神经损伤
101. 对血液灌注不足的肢体，应将患肢抬高超过心脏水平
A. 15cm 以下 B. 15~20cm C. 25~45cm D. 45cm 以上
102. 股骨颈骨折病人应保持肢体于
A. 外展中立位 B. 外展内旋位 C. 内展中立位 D. 内展外旋位
103. 为了保持骨牵引的有效性，牵引方向应
A. 与远端肢体成直线 B. 与近端肢体成直线
C. 与近端肢体成 45° 角 D. 与远端肢体成 45° 角
104. 下列以格拉斯昏迷计分法进行评分的结果，错误的是
A. 有自发睁眼评 4 分 B. 能正确回答问题的评 5 分
C. 能进行按要求做动作的评 6 分 D. 肢体异常屈曲评 2 分
105. 决定颅内血肿病人是否需要手术的最有价值的指征是
A. 生命体征 B. 意识状态 C. 肢体活动情况 D. 瞳孔变化
106. 脑室引流的位置是：引流管开口应
A. 高于侧脑室 30cm B. 高于侧脑室 10~15cm
C. 低于侧脑室 10~15cm D. 低于侧脑室 30cm

107. 对冬眠低温疗法描述错误的是
A. 先用物理降温，以减少冬眠药物的副反应
B. 降温所用冰袋必须加布套并定时更换部位，定时局部按摩，以免冻伤
C. 降温以每小时下降1℃为宜 D. 疗程一般为3~5天
108. TUR 综合征出现的原因是
A. 大量冲洗液的吸收 B. 出血过多 C. 神经反射 D. 手术损伤
109. 前列腺手术后病人出院后避免大运动量的时间为
A. 1~2月 B. 3月 C. 半年 D. 1年
110. 膀胱全切输尿管皮肤造瘘的病人，术后护理重点是要观察成形皮肤乳头粘膜的
A. 出血情况 B. 血运情况 C. 感染情况 D. 以上都是
111. 心脏术后坠积性肺炎采用机械通气患者吸痰前，应将氧气浓度调至
A. 50%以上 B. 60%以上 C. 70%以上 D. 80%以上
112. 为确保引流效能，胸腔闭式引流瓶应低于胸壁引流口平面的距离是
A. 30cm B. 40cm C. 50cm D. 60~100cm
113. 开放性气胸现场急救首要措施是
A. 包扎伤口 B. 封闭胸壁伤口 C. 胸膜腔引流 D. 穿刺抽气
114. 食管癌术后因吻合口狭窄出现吞咽困难，常发生在术后
A. 1周 B. 2周 C. 3~4周 D. 5~6周
115. 全肺切除术后为了预防纵隔移位，可采取
A. 侧卧位 B. 平卧位 C. 1/4侧卧位 D. 半坐卧位
116. 心脏手术后维持尿量（ ）以上
A. 0.5ml/kg.h B. 1ml/kg.h C. 1.5ml/kg.h D. 2ml/kg.h
117. 运送胸腔闭式引流病人正确的方法是
A. 分离连接处，并用无菌纱布包裹 B. 血管钳夹闭引流管
C. 双钳夹闭引流管 D. 胶布固定
118. 急性水中毒时，危害最重的器官是
A. 心脏 B. 肾脏 C. 脑 D. 肺脏

119. 急诊情况下未能按常规洗手，则应

- A. 先戴两付手套，后穿手术衣
- B. 先穿手术衣，再戴两付手套
- C. 先戴一付手套，穿好手术衣后再戴一付手套
- D. 先穿手术衣，后戴手套

120. 开放性颅脑损伤病人处理伤口的正确方法是

- A. 局部冲洗，涂上外用药
- B. 局部冲洗，不涂外用药
- C. 局部不冲洗，不涂外用药
- D. 局部不冲洗，涂上外用药

二、多选题（占 20%，60 分，每题 2 分，30 道题）

1. 护理诊断的内容包括：

- A. 病人疾病的行为反应
- B. 护理对象生命过程的反应
- C. 病人疾病的病理变化
- D. 病人生理、心理、社会等影响健康的问题
- E. 病人的治疗变化

2. 健康促进是干预对人体健康有害的：

- A. 心理状态
- B. 生活方式
- C. 生活环境
- D. 生活行为
- E. 生理状态

3. 护理的任务是

- A. 减轻痛苦
- B. 治疗疾病
- C. 恢复健康
- D. 促进健康
- E. 维持健康

4. 热疗的禁忌部位

- A. 面部危险三角区
- B. 心前区
- C. 恶性肿瘤
- D. 急腹症
- E. 腿部钢钉固定处

5. 进行肌酐试验饮食期间，禁用的食物为

- A. 猪肉
- B. 浓茶
- C. 藕粉
- D. 咖啡
- E. 鲫鱼

6. 医院中的中危物品有

- A. 体温表
- B. 血压计袖带
- C. 便器
- D. 压舌板
- E. 支气管镜

7. 短时间内大量输入库血可以引起

- A. 高血钾
- B. 出血倾向
- C. 枸橼酸钠中毒
- D. 溶血反应
- E. 循环负荷过重

8. 输血引起过敏反应的原因是：

9. 瞳孔观察的内容主要有

- A. 两侧瞳孔的形状
- B. 两侧瞳孔的对称性和边缘
- C. 两侧瞳孔的大小
- D. 两侧瞳孔的对光反应
- E. 两侧瞳孔的颜色

10. 提示阻塞性通气障碍的肺功能检查结果是：

- A. 第一秒用力呼气量占用力肺活量的比值增大
- B. 最大通气量减少
- C. 残气量增加
- D. 肺总量减少
- E. 残气量占肺总量的比值增加

11. 提示上消化道出血病人已无活动性出血的依据有：

- A. 情绪安静
- B. 柏油样便转为暗红色
- C. 无口渴
- D. 脉压由小变大
- E. 网织红细胞持续增高

12. 制酸剂合理的服用时间是：

- A. 饭前 30 分钟
- B. 饭前 2 小时
- C. 疼痛发作前 30 分钟
- D. 疼痛发作前 2 小时
- E. 疼痛发作时

13. 急性心肌梗死病人监护内容包括：

- A. 意识状态
- B. 呼吸
- C. 血压
- D. 心律和心率
- E. 尿量

14. 急性肾衰竭少尿期的电解质紊乱有：

- A. 低钾血症
- B. 低钠血症
- C. 高磷血症
- D. 高钙血症
- E. 高镁血症

15. 上运动神经瘫痪的特征有：

- A. 腱反射亢进
- B. 肌张力增强
- C. 病理反射阳性
- D. 肌萎缩明显
- E. 有电变化反应

16. 颅内高压代偿期生命体征的变化有：

- A. 体温升高
- B. 脉搏慢而有力
- C. 血压升高
- D. 呼吸深而慢
- E. 心律失常

17. 属于杀菌剂的抗结核药有：

- A. 乙胺丁醇
- B. 利福平
- C. 异烟肼
- D. 链霉素
- E. 对氨基水杨酸钠

18. 消化性溃疡大出血病人的临床表现有：

- A. 呕血、黑便
- B. 腹肌紧张
- C. 肠鸣音活跃
- D. 失血性休克
- E. 腹部可见肠型、肠蠕动波

19. 配合医师抢救急性左心衰竭病人时，护士应做的工作有：

- A. 安置病人于重症监护病房，监测心电、呼吸、血压、尿量等变化
- B. 协助病人取坐位及双腿下垂
- C. 四肢结扎止血带以减少回心血量
- D. 给予高流量经 20%-30% 乙醇湿化的氧气鼻导管吸入
- E. 抢救过程中应随时与医生讨论病情以便及时处理

20. I 型糖尿病的特征有：

- A. 青少年发病多见
- B. 发病主要因素是遗传易感性
- C. 与发病相关的病毒感染有柯萨奇 B₄ 病毒及腮腺炎病毒
- D. 胰岛素分泌绝对缺乏
- E. 呈酮症酸中毒倾向

21. 口服铁剂的正确护理指导是：

- A. 应在饭前服用以利吸收
- B. 液体铁剂用吸管吸服以免将牙染黑
- C. 服药后忌饮浓茶以免影响铁剂吸收
- D. 加服维生素 C 以利铁剂吸收
- E. 经铁剂治疗血红蛋白恢复正常后即可停服

22. 下列哪些因素参与调节体液 PH 恒定

- A. 血液缓冲系统
- B. 肺脏呼吸功能
- C. 肾脏的排泄和重吸收功能
- D. 每天饮水量的调节
- E. 抗利尿激素和醛固酮

23. TPN 可能的并发症有

- A. 败血症
- B. 腹泻
- C. 血糖紊乱
- D. 吸入性肺炎
- E. 皮下气肿

24. 5% 硫代硫酸钠溶液可用于对抗下列哪些化疗药外渗到皮下的毒性作用

- A. 阿霉素
- B. 长春新碱
- C. 丝裂霉素
- D. 放线菌素、更生霉素
- E. 氮芥

25. 关于乳腺检查，下列哪些是错误的

- A. 触诊时应用手指掌面循序进行
- B. 不能用手指抓捏乳房组织
- C. 查腋窝淋巴结时应让病人上肢上举
- D. 查肩胛下淋巴结时，应面对病人
- E. 查肩胛下淋巴结时，应站于病人背面

26. 急性腹膜炎患者可能存在的全身病理变化有
- A. 缺氧、发绀 B. 水、电解质紊乱
C. 毒血症 D. 感染性休克
E. 早期即出现 DIC
27. 脑室引流速度过快可能的危险是
- A. 硬脑膜下血肿 B. 患有脑室系统肿瘤者可出现瘤卒中
C. 颅后窝占位病变者可出现小脑中央叶疝嵌入小脑幕裂孔
D. 蛛网膜粘连 E. 以上都正确
28. 张力性气胸可引起
- A. 伤侧肺完全萎缩 B. 健侧肺部分萎缩
C. 气管及纵隔移向健侧 D. 回心血量减少
E. 横膈升高
29. 静脉肾盂造影前常规准备工作包括
- A. 检查前 2~3d 禁用不透 X 线药物 C. 碘过敏试验
B. 少渣饮食 D. 术日晨禁食并排便 E. 检查前排空膀胱
30. 骨折特有的并发症
- A. 损伤性休克 B. 内脏损伤 C. 感染
D. 骨筋膜室综合症 E. 脂肪栓塞综合症

三、问答题（病例分析）（占 20%，60 分，每题 20 分，3 道题）

1、张某，男性，42岁，汉族，因上腹部持续性疼痛，且阵发性加重2天入院。患者发病当天进食油腻食物较多，餐后即感上腹部疼痛，呈持续性、进行性加重，伴恶心、呕吐数次，呕吐物为胃内容物，次日上腹部疼痛加剧，并放射至腰背部，呈束带状，伴发热，体温最高达38.6℃。既往有胆结石病史10余年。医嘱给予氧哌嗪青霉素及环丙沙星静脉点滴。静脉用药2分钟后患者出现胸闷、气促、面色苍白、出冷汗，测得的血压为9/6kpa，神志清、脉细弱，请问：

- (1) 该患者可能发生了什么情况？该反应属于哪一型免疫变态反应？
(2) 试述其主要临床表现。该阶段机体释放的炎性介质主要有哪些？
(3) 如何进行急救和护理？

2、吴先生，48岁。肝硬化病史6年，近3天由于腹胀难忍，自服速尿数片后尿量较平常明显增多，且出现睡眠时间倒错，语言不清，不能完成简单计算。体格检查：巩膜轻度黄染，胸前可见3个蜘蛛痣，腹软，肝肋下未扪及，脾肋下约4cm，移动性浊音阳性，双上肢有扑翼样震颤。问：

- (1) 该患者病情发生了什么变化？最可能的诱因是什么？
- (2) 请列出该患者的主要护理诊断及合作性问题。
- (3) 简述护理要点。

3、王先生，35岁。腰痛2年伴左腿痛1年，加重半年。咳嗽时疼痛加重，卧床休息后稍有缓解。经推拿、牵引等保守治疗3年无效，影响生活及工作。检查发现腰椎侧弯，腰5棘突左侧压痛，并向左臀部及左下肢放射。左Laseque征(+)，小腿外侧痛觉减弱。屈颈试验(+)。腰椎X线片未见明显骨质改变。

- (1) 该患者最可能的诊断是什么？
- (2) 该患者应接受什么治疗？接受该治疗时应该注意什么问题？
- (3) 出院时应对患者进行哪些方面的健康宣教？