

苏州大学

2011 年硕士研究生入学考试初试试题（ B 卷 ）

科目代码: 308 科目名称: 护理综合 满分: 300 分

注意: ①认真阅读答题纸上的注意事项; ②所有答案必须写在答题纸上, 写在本试题纸或草稿纸上均无效; ③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回!

一、单选题 (占 60%, 180 分, 每题 1.5 分, 120 道题)

1、护理程序是科学地认识、分析和解决问题的

- A、工作前提 B、工作方法 C、工作基础 D、工作方针

2、某女, 55 岁, 护士通过收集资料确认目前存在以下护理问题, 你认为应该首先解决的是

- A、腹泻 B、清理呼吸道无效
C、语言沟通障碍 D、营养失调: 低于机体需要

3、下列哪一项属于独立性护理措施

- A、翻身每 2 小时一次 B、输血 C、低盐饮食 D、地西洋 5mg 口服

4、在护理计划中, 预期目标陈述的是

- A、护理活动所应达到的程度 B、家属对病人的支持程度
C、病人健康状况应达到的水平 D、医疗活动所应达到的水平

5、1919 年在哪个国家颁布了第一部国际护理法

- A、中国 B、英国 C、美国 D、加拿大

6、没有自理能力的病人, 按照奥伦的理论应该采取

- A、全补偿系统 B、部分补偿系统 C、支持—教育系统 D、以上都不是

7、昏迷病人所采用的护患关系模式是

- A、主动—被动型 B、指导—合作型 C、共同参与型 D、以上都不是

8、“入乡随俗” 是人类哪一层面的适应

- A、生理 B、心理 C、社会文化 D、技术

9、对高危人群定期筛查, 做到早期发现、早期诊断、早期治疗, 属于

- A、临床前期预防 B、三级预防 C、二级预防 D、一级预防

10、什么是护理的永恒主题

- A、进行治疗 B、照顾帮助护理对象 C、抢救病人 D、执行医嘱

11、人类生存的物理和生物环境是属于

- A、生态环境 B、内环境 C、人文社会环境 D、治疗性环境

12、下列哪项不属于护士的角色范畴

- A、健康教育者 B、健康咨询者 C、病人利益维护者 D、治疗计划者

13、罗伊适应模式中的一级评估是指

- A、因素评估 B、诊断评估 C、行为评估 D、目标评估

14、卫生防疫机构属于

- A、卫生组织 B、卫生事业组织 C、群众卫生组织 D、医疗机构

15、某男学生发热已三天, 照常上课, 认为挺一挺就能过去, 这位学生患病后的角色适应问题属于

- A、病人角色行为消退 B、病人角色行为强化
C、病人角色行为冲突 D、病人角色行为缺如

16、噪声强度达到_____时, 即能产生相当的干扰

- A、80-90 dB B、70-80 dB C、60-70 dB D、50-60 dB

17、新生儿及老年患者的最佳室温为:

- A、18-20℃ B、22-24℃ C、24-26℃ D、26-28℃

18、椎管内麻醉后去枕平卧 6 小时的目的是:

- A、改善脑部血循环 B、预防脑压降低 C、预防脑缺血 D、预防血压降低

19、甲状腺术后取半卧位的目的是:

- A、减轻疼痛 B、减轻呼吸困难 C、减轻局部出血 D、减少回心血量

20、休克患者皮肤出现的改变是:

- A、发红 B、发绀 C、苍白 D、弹性差

21、REM sleep 不出现什么情况

- A、心率增快 B、分泌生长激素 C、眼球转动 D、做梦

22、适用于内镜消毒的消毒剂为:

- A、过氧乙酸 B、戊二醛 C、乙醇 D、环氧乙烷

23、下列区域属于半污染区的是:

- A、病房 B、值班室 C、治疗室 D、医护办公室

24、可导致脉率减慢的是

- A、贫血 B、心衰 C、休克早期 D、颅内高压

25、代谢性酸中毒时患者的呼吸表现为:

- A、呼吸费力 B、鼾声呼吸 C、叹息样呼吸 D、深而规则的大呼吸

26、热水坐浴的温度为:

- A、低于 30℃ B、32-34℃ C、40-45℃ D、50-60℃

27、低盐饮食每日食盐不可超过:

- A、1 克 B、2 克 C、3 克 D、4 克

28、流质饮食不宜长期使用的原因:

- A、影响病人食欲 B、影响消化吸收

- C、影响热量与营养素摄入 D、患者不愿接受
- 29、肝昏迷患者禁用何种溶液灌肠：
A、生理盐水 B、醋酸溶液 C、肥皂水 D、温开水
- 30、下消化道出血的患者，其粪便颜色通常为：
A、鲜红 B、暗红 C、柏油样 D、果酱样
- 31、下列哪种颜色是剧毒药物标签上的颜色：
A、红色 B、黑色 C、蓝色 D、黄色
- 32、氧气物化吸入时，氧流量应调至：
A、1-2L/min B、2-4L/min C、4-6L/min D、6-8L/min
- 33、为成人进行人工呼吸时的吹气量为：
A、300-400ml B、500-600ml C、700-1100ml D、1200-1500ml
- 34、成人每次洗胃灌注量应为：
A、200ml B、300-500ml C、500-700ml D、700-1000ml
- 35、现代临终关怀始于 20 世纪 60 年代，其创始人是：
A、桑巴斯 B、桑德斯 C、路易斯 D、黄天中
- 36、临终患者最后消失的感觉是：
A、听觉 B、触觉 C、视觉 D、嗅觉
- 37、ARDS 患者实施机械通气治疗时，适当给予 PEEP，一般先从_____cmH₂O 开始
A、3 B、4 C、5 D、6
- 38、某肺心病患者近 3 日来呼吸困难加重，血气分析示 PaO₂ 50mmHg，PaCO₂ 55mmHg，宜采用
A、低浓度间歇给氧 B、低浓度持续给氧 C、高浓度间歇给氧 D、高浓度持续给氧
- 39、护士指导病人留取痰标本时，不正确的方法是
A、最好清晨留取痰标本 B、最好在刷牙后留取痰标本
C、用力咳出呼吸道深处痰液 D、注意防止上呼吸道分泌物的污染
- 40、控制哮喘急性发作的首选药物是
A、β₂受体激动剂 B、糖皮质激素 C、抗胆碱能药物 D、茶碱类
- 41、判断肺结核病人有无传染性，最重要的依据是
A、痰中带血 B、X 线检查示病灶有空洞
C、结核菌素试验阳性 D、痰结核菌检查阳性
- 42、某人原有慢性阻塞性肺疾病，呼吸困难、发绀，近日咳嗽加剧，突然发生右侧胸痛，约 30 分钟后呼吸困难突然加剧，患侧胸壁叩诊呈鼓音，听诊呼吸音消失。该患者可能发生
A、自发性气胸 B、肋间神经痛 C、膈下脓肿 D、肋骨骨折
- 43、29 岁女士，患支气管扩张 10 年，咳嗽、咳脓性痰，痰量 50ml/d，下列处理不当的是
A、体位引流 B、加强营养 C、长期应用抗生素 D、给予祛痰剂

- 44、室性心动过速患者，血压 80/55mmHg，宜采取的治疗措施是
A、利多卡因静注 B、胺碘酮静注 C、同步直流电复律 D、非同步直流电复律
- 45、引起心力衰竭最常见的诱因是
A、劳累 B、呼吸道感染 C、情绪激动 D、输液过快
- 46、李先生，心脏病，长期服用地高辛，护士在每次发药时特别要注意的是
A、核对病人的床号、姓名 B、叮嘱病人在饭后服药
C、服药前仔细测量病人的脉搏 D、注意发药到口
- 47、急性心肌梗死患者发生便秘时，首先应采取的措施是
A、温热肥皂水低压灌肠 B、给缓泻剂 C、给硫酸镁口服导泻 D、协助患者床上排便
- 48、高血压患者饮食原则是
A、鼓励多吃低钠高钙高钾的食物 B、鼓励多吃低钠低钙高钾的食物
C、鼓励多吃低钠高钙低钾的食物 D、鼓励多吃低钠低钙低钾的食物
- 49、肥厚性梗阻型心肌炎患者出现胸痛时不宜采取的治疗手段是
A、卧床休息 B、硝酸甘油含服 C、美托洛尔口服 D、吸氧
- 50、导致动脉粥样硬化最重要的危险因素为
A、高血压 B、性别 C、肥胖 D、血脂代谢异常
- 51、肝硬化最常见的并发症是
A、肝性脑病 B、感染 C、原发性肝癌 D、上消化道出血
- 52、男性，40 岁，可疑原发性肝癌，最有助于诊断的化验是
A、癌胚抗原测定 B、碱性磷酸酶测定 C、甲胎蛋白测定 D、异常凝血酶原测定
- 53、患者，男性，肝硬化病史 10 年，现出现言语不清、书写障碍、睡眠倒错，扑翼样震颤(+)，脑电图特异性异常，属肝性脑病
A、前驱期 B、昏迷前期 C、昏睡期 D、昏迷期
- 54、提示消化性溃疡急性穿孔最有价值的体征是
A、上腹痛加剧 B、腹肌紧张 C、疼痛节律性消失 D、肝浊音界消失
- 55、慢性浅表性胃炎最主要的病因是
A、幽门螺杆菌感染 B、高盐饮食，缺乏蔬菜水果
C、服用大量 NSAID D、自身免疫
- 56、患者出现呕血时，提示胃内积血量达到多少？
A、150-250ml B、250-350ml C、350-450ml D、>450ml
- 57、下列有关消化性溃疡的用药护理正确的是
A、抗酸药应在饭前 1h 和睡前服用 B、硫糖铝片宜在饭后 1h 服用
C、氢氧化铝凝胶应避免与奶制品同时服用 D、H₂受体拮抗剂应在餐前服用
- 58、评估急性胰腺炎病人的病情，哪项最能说明该病人预后不佳

- A、体温 39℃ B、黄疸 C、合并代谢性酸中毒 D、手足抽搐
- 59、留置双气囊三腔管的病人突然出现呼吸困难和发绀，此时首要的处理原则是
- A、给氧 B、吸痰 C、将气囊再插入 20cm D、给气囊放气
- 60、中段尿培养的阳性标准是菌落计数大于
- A、 10^3 /ml B、 10^4 /ml C、 10^5 /ml D、 10^6 /ml
- 61、患者男性，50 岁，肾小球肌酐清除率减少至 20ml/min，血肌酐 $600\mu\text{mol/L}$ ，夜尿增多，水、电解质紊乱，此病人肾功能不全的分期为
- A、肾储备能力下降期 B、氮质血症期 C、肾衰竭期 D、尿毒症期
- 62、引起慢性肾功能衰竭的最常见病因是
- A、慢性肾盂肾炎 B、慢性肾小球肾炎
C、肾结核 D、慢性尿路梗阻
- 63、患者女性，36 岁，突然寒战、高热伴尿频、尿急、尿痛，右肾区叩击痛。尿常规白细胞+++，红细胞++，最可能是
- A、急性肾小球肾炎 B、急性肾盂肾炎 C、肾结核 D、肾病综合征
- 64、患者女性，68 岁，近一个月来厌食，皮肤瘙痒。查尿蛋白(+++)，血 Cr $820\mu\text{mol/L}$ ，诊断为慢性肾功能不全、尿毒症期。护理其皮肤瘙痒的措施不正确的是
- A、用温水擦洗皮肤 B、洗澡后涂抹润肤霜
C、用碱性强的肥皂彻底清洗皮肤 D、勤换内衣
- 65、口服铁剂治疗缺铁性贫血时，早期有效的指标是
- A、红细胞计数升高 B、血红蛋白升高
C、网织红细胞计数升高 D、红细胞比积恢复
- 66、女青年再障患者使用丙睾酮最常出现的一个护理问题是
- A、舒适的改变 B、活动无耐力 C、知识缺乏 D、身体意象紊乱
- 67、特发性血小板减少性紫癜病人的最重要护理措施是观察和预防
- A、胃肠道出血 B、脑出血 C、鼻出血 D、尿道出血
- 68、血小板低于下列哪个值时，临床应警惕颅内出血
- A、 $50\times 10^9/\text{L}$ B、 $40\times 10^9/\text{L}$ C、 $30\times 10^9/\text{L}$ D、 $20\times 10^9/\text{L}$
- 69、里-斯细胞常出现于下列哪种疾病
- A、何杰金氏病 B、非何杰金氏病 C、骨髓瘤 D、急性淋巴细胞型白血病
- 70、维甲酸可用于下列何种白血病的诱导化疗？
- A、急性原始粒细胞白血病 B、急性早幼粒细胞白血病
C、急性单核细胞白血病 D、急性红白血病
- 71、女性，28 岁，甲状腺功能亢进病史半年，妊娠 3 个月，甲状腺功能亢进症状加重，治疗首选
- A、甲巯咪唑 B、卡比马唑 C、甲基硫氧嘧啶 D、丙基硫氧嘧啶

- 72、对可疑糖尿病患者最有价值的检查是
- A、空腹血糖 B、餐后 2h 小时尿糖 C、口服葡萄糖耐量试验 D、糖化血红蛋白测定
- 73、下列哪项为痛风急性关节炎发病的诱因
- A、酗酒 B、过度疲劳 C、感染 D、寒冷
- 74、下列哪项不是痛风急性发作期的表现？
- A、突然发作的关节红肿热痛 B、常在夜间发作，因疼痛而惊醒
C、可有关节腔积液，伴发热等全身反应 D、最易受累的部位为跖关节
- 75、出现下列哪项症状常提示有脑出血
- A、深而快的库氏呼吸 B、呼吸过慢并伴有叹息样呼吸
C、鼾声呼吸并伴有一侧面肌瘫痪 D、呼吸浅快
- 76、护理频繁呕吐伴有突然头痛的患者时，发现其意识不清，脉搏、呼吸减慢，左右瞳孔不等大，应考虑
- A、脑疝形成 B、脑血栓形成 C、高血压危象 D、蛛网膜下腔出血
- 77、下列有关脑梗死急性期的治疗错误的是
- A、早期溶栓 B、尽早应用血管扩张剂降血压
C、防治脑水肿 D、高压氧舱治疗
- 78、某男性 GBS 病人，因呼吸肌麻痹进行紧急抢救，请问下列哪项措施不妥？
- A、改善通气，纠正缺氧 B、保持呼吸道通畅
C、及时使用人工呼吸机 D、持续高浓度高流量给氧
- 79、某男，29 岁，因突然发作性全身抽搐，口吐白沫，大小便失禁而入院治疗，既往有癫痫病史，护士进行健康宣教时，下列哪项是错误的
- A、生活规律，劳逸结合 B、不能从事爬高、游泳、驾驶等工作
C、癫痫发作停止三个月后可停药 D、服药期间定期复查血常规和肝功能
- 80、在传染过程中，病原体与人体相互作用时，保持暂时平衡状态，不出现临床表现，但当机体防御机能减低时，原已潜伏在人体内的病原体便乘机繁殖，引起发病，称之为
- A、隐性感染 B、显性感染 C、潜伏性感染 D、病原携带状态
- 81、流行性乙型脑炎最主要的传染源是
- A、蚊 B、跳蚤 C、老鼠 D、猪
- 82、伤寒病人易出现肠出血、肠穿孔的时间是
- A、病程第 1 周 B、病程第 2~3 周 C、病程第 3~4 周 D、病程第 5 周
- 83、下列属于乙类传染病的是
- A、霍乱 B、传染性非典型肺炎 C、流行性腮腺炎 D、麻风
- 84、CO 经呼吸道进入血液中，最先受累的脏器是
- A、心 B、肺 C、肾 D、脑
- 85、男性，40 岁，急性肠梗阻入院。主诉口渴、尿少。体检示：尿少、眼球下陷、脉速、血压 90/60mmHg。

- 估计其脱水的性质和程度为
- A、中度等渗性脱水 B、中度高渗性脱水 C、中度低渗性脱水 D、重度高渗性脱水
- 86、关于低血容量性休克，下列哪项陈述不正确
- A、病因包括失血、失液、创伤等 B、创伤后疼痛严重者需适当给予镇痛剂
- C、治疗首先考虑输血以补充血容量 D、不一定伴有严重创伤
- 87、硬膜外阻滞引起截瘫的原因是
- A、脊神经损伤 B、全脊髓麻醉 C、局麻药毒性反应 D、硬膜外血肿
- 88、手术区皮肤的消毒范围，应包括切口周围
- A、5cm B、10cm C、15cm D、20cm
- 89、下列疾病中应行急诊手术的是
- A、胰头癌致梗阻性黄疸 B、乙状结肠癌伴肠梗阻 C、直肠癌 D、乳腺癌
- 90、人体 24 小时总氮丧失量的简易估算公式为
- A、24 小时尿内尿素氮排出量 (g) +1g B、24 小时尿内尿素氮排出量 (g) +2g
- C、24 小时尿内尿素氮排出量 (g) +3g D、24 小时尿内尿素氮排出量 (g) +4g
- 91、控制破伤风病人痉挛的最主要措施是
- A、保持病室安静 B、使用镇静及解痉剂 C、限制亲友探视 D、静滴破伤风抗毒素
- 92、成人体重 50kg，烧伤面积：Ⅰ°10%，Ⅱ°30%，Ⅲ°20%，伤后第一天的前 8 小时应补晶体和胶体液的总量为
- A、1975ml B、1875ml C、2975ml D、3750ml
- 93、甲亢患者术前服用碘剂最长不宜超过
- A、2 周 B、3 周 C、4 周 D、6 周
- 94、乳癌患者行乳房改良根治术的主要特点是
- A、保留乳头 B、仅解除肿瘤 C、切除整个乳房 D、保留胸肌
- 95、引起继发性腹膜炎的最常见的致病菌是
- A、链球菌 B、大肠杆菌 C、变形杆菌 D、肠球菌
- 96、嵌顿性疝与绞窄性疝的区别是
- A、疝囊有无压痛 B、疝内容物能否回纳 C、疝内容物有无血运障碍
- D、是否有机械性肠梗阻的表现
- 97、女性，22 岁，从电瓶车上摔下，局部腹壁瘀斑，阵发性腹痛，住院期间若需手术探查，下列哪项指征错误
- A、腹痛进行性加重 B、血压明显下降
- C、X 线下示膈下游离气体 D、腹部透视发现胃扩张
- 98、男性，46 岁，患有十二指肠溃疡 8 年余，此次入院行迷走神经干切断术，术后第五日，已拔除胃管，今晨进食后出现上腹部不适、饱胀、呕吐胆汁和食物。X 线造影见胃扩张、大量潴留、无排空，考虑

- 并发了
- A、吻合口梗阻 B、输出袢梗阻 C、胃潴留 D、胃小弯处穿孔
- 99、肠梗阻病人可出现下列全身性病理改变，但除外
- A、水电解质紊乱 B、感染和毒血症
- C、急性中毒性肠扩张 D、呼吸和循环功能障碍
- 100、男，40 岁，因急性阑尾炎入院，入院后腹痛曾有短暂缓解，以后又呈持续性加剧，应考虑
- A、化脓性阑尾炎 B、穿孔性阑尾炎 C、阑尾周围脓肿 D、单纯性阑尾炎
- 101、直肠肛管疾病病人非手术治疗期间宜采用何种饮食
- A、少渣半流质 B、流质 C、普食 D、高纤维素饮食
- 102、男性，41 岁，乙肝病史 10 余年，近来自觉右上腹胀痛，首选的检查是
- A、MRI B、B 型超声波检查 C、核素肝扫描 D、腹腔镜
- 103、男性，50 岁，急诊入院，神志不清，出冷汗，脉搏细速，血压 80/40mmHg，诊断为“急性梗阻性化脓性胆管炎”，其体位应取
- A、头低足高位 B、头高足低位 C、半坐卧位 D、坐位
- 104、重症胰腺炎病人可出现血糖
- A、降低 B、明显降低 C、升高 D、时高时低
- 105、决定下肢静脉曲张能否手术治疗的主要检查是
- A、Perthes 试验 B、Trendelenburg 试验 C、Buerger 试验 D、Pratt 试验
- 106、小脑幕切迹疝病人瞳孔变化及肢体瘫痪的特点是
- A、病变同侧瞳孔变化及同侧肢体瘫痪 B、病变同侧瞳孔变化及对侧肢体瘫痪
- C、病变对侧瞳孔变化及同侧肢体瘫痪 D、病变对侧瞳孔变化及对侧肢体瘫痪
- 107、严重颅脑损伤病人的急救首先应
- A、检查神志、瞳孔 B、监测生命体征 C、保持呼吸道通畅 D、准备急诊手术
- 108、连枷胸、开放性气胸、张力性气胸或血胸均可发生的表现是
- A、纵隔移位或摆动 B、极度呼吸困难 C、心跳骤停 D、血压骤降
- 109、男性，58 岁，胸片示：2cm×2、5cm 大小的左肺肿块影，并左胸腔积液，支气管纤维镜检查为鳞癌，行左上肺叶加淋巴结切除，手术后第二天生命体征平稳，病人可进行的活动是
- A、在床边移步 B、在护士协助下在床上进行四肢活动
- C、在护士协助下室内行走 5 分钟左右 D、可独自活动
- 110、男性，25 岁，饭后“烧心”感，体重明显下降，被诊断为“反流性食管炎”，下列护理措施正确的是
- A、餐后立即平卧 B、睡前一小时进食
- C、予高脂饮食 D、摄入不足部分由肠外营养补充
- 111、青年男性，尿道损伤后出现排尿困难，导尿管能插入膀胱，导尿管的留置时间为

- A、1~3天 B、4~5天 C、10~14天 D、21~28天
- 112、 输尿管结石嵌顿、绞痛发作时，最重要的处理方法是
- A、大量饮水 B、准备手术治疗 C、解痉止痛 D、跳跃运动
- 113、 诊断前列腺增生最简单易行的方法是
- A、B超 B、膀胱镜检查 C、膀胱造影 D、直肠指检
- 114、 女性，72岁，吸烟50年，30支/天，现发生无痛、间歇、全程、肉眼血尿一周，尿中有血凝块，来院就医，体检：全身情况良好，未发生异常体征，首先考虑该患者发生了下列哪种疾病
- A、膀胱炎 B、膀胱肿瘤 C、肾癌 D、膀胱结核
- 115、 保持高位颈椎骨折患者呼吸道通畅的最有效的措施是
- A、雾化吸入 B、指导患者深呼吸和有效咳嗽
- C、患侧居上，轻扣胸背部 D、早期实施气管切开
- 116、 骨折后，若反复整复，可导致的不良后果中最多见的是
- A、骨折不愈合 B、骨折延迟愈合 C、皮肤坏死 D、骨折移位
- 117、 男性，14岁，后仰摔伤左肘关节，局部疼痛、肿胀、功能障碍。体检：左肘关节明显肿胀、压痛、尺骨鹰嘴向后突出，肘关节半屈位，肘后三角关系破坏，该患者发生了
- A、左肘关节前脱位 B、左肘关节后脱位 C、左肱骨髁伤骨折 D、左尺骨鹰嘴骨折
- 118、 下列哪种类型的颈椎病发病率最高
- A、神经根型 B、脊髓型 C、椎动脉型 D、交感神经型
- 119、 化脓性关节炎最常发生的部位是
- A、肩关节和肘关节 B、肘关节和膝关节 C、髋关节和膝关节 D、膝关节和踝关节
- 120、 股骨下端肿瘤，局部皮温高，静脉怒张，X线片示股骨下端有边界不清的骨质破坏区，有三角状骨膜反应。可能是
- A、股骨下端骨肉瘤 B、骨巨细胞瘤 C、骨软骨瘤 D、内生骨软骨瘤

二、多选题（占20%，60分，每题2分，30道题）

- 1、收集资料的方法包括
- A、询问病史 B、观察病情 C、阅读病案 D、向其他医务人员咨询 E、护理体检
- 2、关于护理程序的特征，以下正确的是
- A、以疾病为中心 B、目标明确
- C、持续性和动态性 D、组织性和计划性 E、互动性和协作性
- 3、书写预期目标的要求包括
- A、切实可行 B、以护理对象为中心 C、一个诊断只有一个目标
- D、属于护理职责范围之内 E、具体、可观察、可测量
- 4、人的心理抵抗线包括

- A、免疫功能 B、遗传特征 C、生理机制
- D、应对行为 E、精神信仰
- 5、健康促进是干预对人体健康有害的：
- A、心理状态 B、生活方式 C、生活环境 D、生活行为 E 生理状态
- 6、应用保护具的目的是防止：
- A、窒息 B、撞伤 C、抓伤 D、扭伤 E 坠床
- 7、需要进行特殊口腔护理的患者是：
- A、高热 B、昏迷 C、禁食 D、危重 E、下肢骨折卧床不起
- 8、能杀灭芽孢的化学消毒剂有：
- A、环氧乙烷 B、过氧乙酸 C、戊二醛 D、甲醛 E、乙醇
- 9、要素饮食的营养充分包括：
- A、蛋白质 B、氨基酸 C、脂肪酸 D、单糖 E、维生素
- 10、下列属于哮喘急性发作中度病情表现的是
- A、稍事活动便有喘息 B、喜坐位 C、只能单字讲话
- D、脉率100~120次/分 E、PaO₂<60mmHg
- 11、白血病患者，体温39.1℃，血小板计数40×10⁹/L，下列护理措施正确的是
- A、保持室内相对湿度50%~60% B、卧床休息 C、保持床单平整
- D、常规使用缓泻剂 E、酒精擦浴降温
- 12、肝硬化腹水形成的主要因素有
- A、门静脉压力增高 B、低清蛋白血症 C、肝淋巴液生成减少
- D、抗利尿激素分泌减少 E、继发性醛固酮增多
- 13、缺铁性贫血的常见病因有
- A、需铁量增加 B、铁摄入不足 C、铁吸收不良
- D、铁丢失过多 E、铁分布异常
- 14、肝性脑病患者的护理正确的是
- A、低蛋白饮食，以优质动物蛋白为主 B、禁用镇静药
- C、大量补液 D、快速利尿 E、盐水加食醋灌肠
- 15、糖尿病患者的饮食疗法应为
- A、尽量少吃主食 B、禁食甜味水果 C、饮食应定时定量
- D、蛋白质应占每日总热量的15% E、多食富含纤维素的食物
- 16、下列临床表现中，与II型呼吸衰竭有关的有
- A、球结膜水肿 B、烦躁不安、昼夜颠倒
- C、呼吸费力、呼气延长 D、扑翼样震颤 E、鼻翼扇动、有三凹征
- 17、慢性心力衰竭的诱因常有

- A、情绪过于激动或紧张 B、呼吸道感染
C、电解质紊乱 D、心律失常 E、输液过快
- 18、在排除妊娠、肝炎和生殖腺胚胎瘤的基础上，AFP 检查诊断肝细胞癌的标准为
A、AFP>500ug/L，持续 4 周 B、AFP 由低浓度逐渐升高不降
C、AFP>200ug/L 以上水平持续 8 周 D、AFP>500ug/L，持续 2 周
E、AFP>200ug/L 以上水平持续 4 周
- 19、血液病病人易于发生感染的部位
A、口腔粘膜 B、肛门 C、呼吸道 D、皮肤 E、眼部球结膜
- 20、糖尿病病人有发生低血糖的危险，其原因与下列哪些因素有关
A、脂质代谢紊乱 B、餐后胰岛素分泌高峰延迟有关
C、酮症酸中毒 D、胰岛素使用不当 E、微循环障碍
- 21、下列哪些措施有助于艾滋病的综合预防
A、已感染 HIV 的育龄妇女应避免结婚 B、加强性道德的教育
C、提倡义务献血，禁止商业献血 D、加强对高危人群的艾滋病疫情监控
E、对艾滋病抗体阳性者禁止入境
- 22、营养状况的评价指标应包括：
A、病史 B、人体测量指标 C、肌酐升高指数
D、血红蛋白 E、血清蛋白质
- 23、关于肠梗阻，下列说法正确的是：
A、回肠梗阻属高位梗阻
B、梗阻肠管有血运障碍者属绞窄性肠梗阻
C、绞窄性肠梗阻必然是急性血运性肠梗阻
D、肠梗阻多表现为腹痛、呕吐、腹胀和停止排便排气
E、肠鸣音亢进和气过水声为机械性肠梗阻的表现
- 24、与格拉斯哥昏迷计分法不符的是
A、呼唤睁眼 3 分 B、吐字不清 4 分 C、回答问题错误 3 分
D、躲避刺痛 3 分 E、回答问题正确 4 分
- 25、深静脉导管行 TPN 治疗 20 天出现寒战,高热,血常规检查白细胞计数 $25 \times 10^9/L$, 疑为导管感染,应作如下处理：
A、拔除 TPN 导管, 更换 TPN 液体 B、剪下导管尖端送细菌培养
C、寒战高热时采血送细菌培养 D、保留 TPN 液体送细菌培养
E、原位更换 TPN 导管
- 26、体外循环术后可能引起的病理生理变化：
A、呼吸性碱中毒 B、低血钾症 C、术后大量渗血

- D、肝功能衰竭 E、肾功能衰竭
- 27、骨折特有的并发症
A、损伤性休克 B、内脏损伤 C、骨筋膜室综合症
D、神经损伤 E、脂肪栓塞综合症
- 28、颈椎病的分型：
A 神经根型 B、脊髓型 C、椎动脉型
D、副交感神经型 E、交感神经型
- 29、甲状腺次全切除后并发症可有：
A、呼吸困难和窒息 B、误咽、呛咳 C、声音嘶哑
D、甲状腺危象 E、手足抽搐
- 30、急性出血坏死性胰腺炎的常见并发症有：
A、急性肾衰竭 B、感染 C、出血
D、急性心功能衰竭 E、急性呼吸窘迫综合征

三、问答题（病例分析）（占 20%，60 分，每题 20 分，3 道题）

1、患者男性，70 岁，输液过程中突然出现呼吸困难、胸闷、咳嗽，咳出大量粉红色泡沫痰，听诊肺部布满湿啰音，心率快且节律不齐。

- (1) 请问患者出现了什么问题？应如何预防和处理？（12 分）
(2) 常见输液故障有哪些？液体不滴时常用的处理方法有哪些？（8 分）

2、患者刘某，男性，44 岁，3 月前受凉后出现发热、乏力，体温最高达 41℃，呈弛张热，伴咳嗽，全身酸痛，无痰，于当地卫生院予“青霉素、左氧氟沙星”治疗后无明显好转，1 周前开始出现手掌部皮疹，全身浮肿，遂转至我院。入院时 T：39.5℃，P：118 次/分，BP：110/70 mmHg。心脏超声示“主动脉瓣关闭不全，主动脉瓣赘生物”而诊断为“亚急性感染性心内膜炎”。问：

- (1) 该病人病情观察的重点是什么？（7 分）
(2) 患者目前的护理问题有哪些？（4 分）
(3) 如何正确地抽取血培养？（9 分）

3、男性，42 岁。患有胃溃疡 8 年余，近几个月来自觉症状加重。6 小时前病人进食后突感上腹部刀割样剧痛，很快延及全腹，伴恶心、呕吐。体检：T37.1℃，P106 次/分，R24 次/分，BP110/80mmHg。腹式呼吸消失，板状腹，全腹压痛和反跳痛，肠鸣音明显减弱，肝浊音界消失，移动性浊音阳性。

请分析：

- (1) 该患者最可能并发了什么问题？（5 分） 首选的辅助检查方法是什么？（3 分）

(2) 该患者目前的主要护理诊断/问题及护理措施是什么？（12 分）