

考试科目名称及代码 口腔综合学 345

适用专业: 口腔临床医学

注意:

1. 所有答案必须写在 “研究生入学考试答题纸” 上, 写在试卷和其他纸上无效;

2. 本科目 不允许使用无字典存储和编程功能的计算器。

一. 名词解释(以下名词解释选择五题, 请: , 超过五题按低分选五题得分)(20 分, 每题 4 分)

注明题号, 不注明不给分

1. 生长叶
2. 小开颌运动
3. 翼丛
4. 根管工作长度
5. 残髓炎
6. 癌前病变
7. 覆盖义齿
8. 第一类骨骼关系

二. 填空题(每题 2 分)

1. _____ 岁到 _____ 岁称为“乳牙骀期”。
2. 鼓索含有两种纤维 A: _____ 布于舌前 2 / 3 味蕾。
B: _____ 管理腺体分泌。
3. 牙髓的基本功能是 _____、_____、_____ 和 _____。
4. 龋病治疗的目的是 _____、_____、_____、_____。
5. 牙周-牙髓联合病损是指发生于 _____ 及牙周韧带并通过一系列途径传播的炎症性损害。
主要通过下列途径感染: _____、_____、暴露的牙本质小管和 _____。
6. 颞下颌关节紊乱病主要症状有 _____, _____, _____。
7. 血管瘤的临床分类有 _____, _____, _____。
8. 牙科瓷粉与合金在烧结后形成的 PFM 修复体时, 瓷与合金之间存在结合形式有① _____
② _____ ③ _____ ④ _____。
9. 固定桥的固位力主要依靠 _____、_____ 和 _____。
10. 审美线指鼻尖和 _____ 的切线。

三. 是非题(10 分, 每题 1 分)

1. 乳牙萌出的顺序是: I II IV III V.

2. 正中殆 (牙尖交错殆), 这种颌关系的下颌位置均位于正中。
3. 根尖发育完成的脱位牙, 若就诊迅速或及时复位时, 应在术后 3—4 周或再做 RCT 术。
4. 临床上除舌尖症状外, 还伴有吞咽困难、指甲扁平、脆化, 这种疾病称白塞氏综合征。
5. 骨纤维异常增殖症属良性骨源性肿瘤。
6. 唾液腺粘液囊中大多为外渗性粘液囊肿。
7. 在印模材料中, 尺寸稳定性最好是琼脂印模料。
8. 确定息止殆位的目的是确定息止颌间隙。
9. 全口义齿大气压力的产生与边缘封闭区的密合程度关系最密切。
10. 牙弓代偿性正畸即通过正畸牙移动, 是上下牙建立正常殆关系并改善面容, 但原来的骨性不调并没有得到改变。

四. 选择题 (50 分 每题 1 分)

1. 第一恒磨牙牙根完全形成是:
 - A. 6 岁 B. 7~8 岁 C. 9~10 岁 D. 11~12 岁
2. 横嵴指:
 - A. 牙冠上的两嵴横向相连 B. 相对牙尖的两三角嵴横过殆面相连
 - C. 面两三角嵴相连而成 D. 牙釉质上的长形线状隆起
3. 所谓“解剖牙冠”是指:
 - A. 暴露于口腔的部分牙体 B. 牙体被牙龈覆盖的部分
 - C. 牙体发挥咀嚼功能的部分 D. 被牙釉质所覆盖的牙体部分
4. “外形高点”是指:
 - A. 牙体长轴于水平面成垂直关系时, 牙体轴面最突出的部分
 - B. 牙冠最突出的点
 - C. 牙体长轴于水平面成垂直关系时, 牙冠各面最突出的部分
 - D. 牙冠邻面相接触点
5. 对“牙尖的解释”, 下面正确的概念是:
 - A. 牙釉质的三角形隆起 B. 有两个斜面相交而成
 - C. 近似锥体性的显著隆起 D. 有两个轴面相交而成
6. 上颌磨牙的主要功能尖是:
 - A. 近中颊尖 B. 近中舌尖 C. 远中颊尖 D. 远中舌尖
7. 下颌处于休息状态时, 上下牙弓自然分开成一楔形间隙称:
 - A. 颌间隙 B. 息止颌间隙 C. 颌高度 D. 颌间距离
8. Bonwill 论述的等边三角形的三个角居于:
 - A. 两侧髁状突的中心及眉间点
 - B. 两侧髁状突的中心及上颌中切牙的近中接触点

南京大学 2004 年攻读硕士学位研究生入学考试试题(三小时)

考试科目名称及代码 口腔综合学 345

适用专业: 口腔临床医学

注意:

1. 所有答案必须写在“研究生入学考试答题纸”上, 写在试卷和其他纸上无效;

2. 本科目: 不允许使用无字典存储和编程功能的计算器。

- C. 两侧髁状突的中心及下颌中切牙的近中接触点
D. 两侧颞下颌关节凹及上颌中切牙的近中接触点
9. 咀嚼肌力对颌骨的影响表现在下面几方面, 除了:
A. 受牵引力处骨质吸收
B. 肌肉附着处肌肉突起成嵴
C. 颌骨内骨小梁排列方向和外力作用相协调
D. 牙槽嵴内骨小梁排列方向和外力作用相协调
10. 有关翼腭管的概念, 哪项是错误的:
A. 上通颞下凹
B. 由腭大孔通口腔
C. 由蝶骨翼突、腭骨垂直部及上颌骨翼腭沟共同围成
D. 管内有腭降动脉和腭神经通过
11. 髁状突的主要功能区为:
A. 髁状突顶部横嵴 B. 髁状突后斜面 C. 髁状突内斜面 D. 髁状突前斜面
12. 对颞下颌关节而言, 下列哪项是错误的:
A. 上腔大而松 B. 下腔小而紧 C. 关节囊厚而紧 D. 关节窝大于关节头
13. 关于面神经的描述, 下列哪项是对的:
A. 为感觉神经 B. 由棘孔出颅 C. 支配咬肌 D. 支配面部表情肌
14. 下列哪个肌肉不参与软腭构成:
A. 咽上缩肌 B. 舌腭肌 C. 腭帆张肌 D. 悬雍垂肌
15. 腮腺浅叶上缘, 神经血管排列由后向前依次为:
A. 颞浅静脉、耳颞神经、颞浅动脉、面神经颞支、颞支
B. 颞浅动脉、耳颞神经、颞浅静脉、面神经颞支、颞支
C. 耳颞神经、颞浅静脉、颞浅动脉、面神经颞支、颞支
D. 面神经颞支、颞浅静脉、颞浅动脉、耳颞神经、颞支
16. 深龋引起的牙髓炎大多是:

- A.慢性牙髓炎 B.急性牙髓炎 C.慢性牙髓炎急性发作 D.牙髓变性
17. 感染根管内的主要细菌是:
A.链球菌类 B.专性厌氧菌 C.兼性厌氧菌 D.放线菌类
18. 牙周袋的形成机制是:
A.龈沟病理性加深 B.牙龈向冠方增生 C.结合上皮向冠方迁移 D.牙龈退缩
19. 一患者, 男性, 60岁, 左侧硬腭大面积溃疡, 表面疱壁, 左侧颧部、眶下部、眶下皮肤簇集性疱疹, 结痂, 疼痛剧烈, 病程四日。诊断该患者为:
A.带状疱疹 B.天疱疮 C.大疱性类天疱疮 D.单纯疱疹
20. 12岁男孩, 多年前上前牙外伤冠折露髓, 现因唇侧龈肿疱就诊, 医师应做的主要检查项目是
A.扣诊 B.查松动度 C.温度测试 D.X线片
21. 以下哪一个词不是指同一位置
A.根尖基点 B.生理性根尖孔 C.组织学根尖孔 D.解剖学根尖孔
22. 牙周炎通过一下那条途径影响糖尿病患者的血糖控制。
A.破坏相关的酶类 B.加重细菌对机体的侵害
C.使胰腺易于形成噬菌区 D.以上均不是
23. 能溶解坏死牙髓, 有强烈杀菌作用, 多用于根管冲洗的是:
A.丁香油 B.次氯酸钠 C.木榴油 D.甲醛酸
24. 不属于根管预备目的是
A.清理根管内病变性牙髓、组织分解产物、细菌及各种菌素
B.扩大根管, 去除根管壁表层感染牙本质, 修整管壁
C.将根管拉成近直线的通道
D.冲洗洁净, 除去根管内残余的物质与碎屑
25. 治疗慢性盘状红斑狼疮首选
A.咪喹莫特 B.氯化奎宁 C.维甲酸 D.氟康唑
26. 颧弓骨折必须手术复位的适应症为:
A.外耳道出血 B.咀嚼无力 C.X片示骨折明显 D.张口受限
27. 口外型舌下腺囊中的手术治疗方法
A.完整地切除囊肿 B.舌下腺切除 C.舌下腺及囊肿切除 D.舌下腺, 下颌下腺切除
28. 下列口腔癌肿转移率最高的是
A.舌癌 B.口底癌 C.颊粘膜癌 D.牙龈癌
29. 可引起严重张口受限的间隙感染是:
A.下颌下间隙 B.颊下间隙 C.眶下间隙 D.嚼肌间隙
30. 翼外肌功能亢进主要症状为
A.开口初关节弹响, 张口受限 B.开口初关节弹响, 开口过大

考试科目名称及代码 口腔综合学 345

适用专业: 口腔临床医学

注意:

1. 所有答案必须写在“研究生入学考试答题纸”上, 写在试卷和其他纸上无效;

2. 本科目: 不允许使用无字典存储和编程功能的计算器。

C. 开口末关节弹响, 张口受限 D. 开口末关节弹响, 张口过大

31. 腭裂术后语音训练一般在术后

A 手术后即进行 B 1 周 C 2 周 D 1 月

32. 下颌角部骨折颌间固定一般应固定

A 2 周 B 4 周 C 6 周 D 8 周

33. 游离皮瓣最容易发生血管危象是在术后

A 24 小时内 B 24~48 小时 C 72 小时 D 1 周内

34. 角化囊肿属于

A 发育性囊肿 B 外渗性囊肿 C 潴留性囊肿 D 牙源性囊肿

35. 干槽症的主要症状为

A. 局部肿胀 B. 创口溢脓 C. 创口周围牙龈坏死 D. 剧烈疼痛

36. 中度四环素牙的年轻患者, 牙列排列齐, 外观无缺损, 初次就诊时首选的治疗是

A. 烤瓷冠修复 B. 全瓷冠修复 C. 全瓷贴面修复 D. 漂白

37. 冠折龈下 3mm 的牙齿在修复时, 首先应做下列那一种治疗

A. 龈切+根管治疗 B. 根管治疗+正畸牵引 C. 根管治疗后钛桩核修复

D 根管治疗后全瓷核修复

38. 冠折龈下 3mm 的牙齿在修复时, 首先应做下列那一种治疗

A 龈切+根管治疗 B 根管治疗+正畸牵引

C 根管治疗后钛桩核修复 D 根管治疗后全瓷核修复

39. 下列哪一种不是粘接桥修复的适应证

A 上颌两个中切牙缺失 B 下颌两个中切牙缺失 C 上颌尖牙缺失 D 下颌第一磨牙缺失

40. 下列铸造合金中, 熔点最高的是: ()

A. 钛合金 B 金合金 C 镍铬合金 D 钴铬合金

41. 下列哪一种材料是具有弹性可逆的印模材料 ()

A. 加聚型硅橡胶 B 聚醚硅橡胶 C 琼脂 D 印模膏

42. 固定桥粘固后短期出现咬殆痛, 最可能的原因是:

A. 牙髓充血 B. 根尖周炎 C. 咬合早接触 D. 固位体边缘不密合

43. 全口义齿试戴时, 发现下半口义齿后退, 是由于:

A. 取颌位时下颌后退 B. 取颌位时下颌前伸
C. 下颌义齿排牙太靠前 D. 下颌义齿排牙太靠后

44. 隙卡沟底不能预备楔形, 且不能破坏两相邻牙的接触点, 是为了:

A. 少磨牙 B. 有利于隙卡弯制 C. 防止食物嵌塞 D. 以免形成楔力使基牙移位

45. 以下边缘类型中强度最差的是:

A. 刃状 B. 90度肩台 C. 凹面 D. 90度肩台加斜面

46. 在替牙期出现暂时性错颌期间, _____ 关系将得到不断的调整。

A. 尖牙 B. 面部 C. 第一磨牙 D. 肌肉关系

47. 国人正常颌的 Bolton 指数, 前牙比为 _____。

A. $78.8\% \pm 1.72\%$ B. $91.5\% \pm 1.51\%$ C. $87.8\% \pm 1.62\%$ D. $76.5\% \pm 1.52\%$

48. 多根牙的阻抗中心在根分叉往根尖方向 _____ 处。

A. 2~3mm B. 1~2mm C. 1.5~2.5mm D. 2~4mm

49. 口外上颌前方牵引器主要用于替牙期或 _____ 上颌发育不足为主的骨性前牙反颌。

A. 恒牙期 B. 中性牙期 C. 近中牙颌期 D. 乳牙期

50. 骨性深覆颌 X 线头影测量显示后前面高的比例大大超过 _____。

A. 65% B. 60% C. 75% D. 80%

五. 问答题(1~3 题为必答题, 不答不得分; 后 5 题自选 2 题, 多答不得分, (

注明题号,

不注明不得分, 超过 2 题按低分选 2 题得分)(50 分, 每题 10 分)

1. 简述口腔颌面部损伤的特点。
2. 根管治疗术常见的并发症及原因是什么?
3. 简述影响修复体类型选择的因素。
4. 根据上颌骨结构特点, 评述其生理意义。
5. 试述双侧游离缺牙的可摘局部义齿的设计要求?
6. 正畸治疗后预防矫治后复发的主要方法有哪些?
7. 口底蜂窝组织炎的诊断及治疗原则。